

219

KOKACHO[®]**30 WG****PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA****INSECTICIDA AGRÍCOLA****GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)****COMPOSICIÓN:**

Emamectín Benzoate 300 g/Kg
 Aditivos de formulación c.s.p. 1 Kg

Reg. PQUA N° 1637 - SENASA**TITULAR DEL REGISTRO: CAPEAGRO S.A.C.****FORMULADO POR:****AGROMOL BIOTECH COMPANY LIMITED**

East side, middle section of Binhe Road, Shanxian County Chemical
 Industry Park, Xieji Town, Shanxian County, Heze City, Shandong
 Province, China.

**Importador y
 Distribuidor:**

CAPEAGRO S.A.C.
 Av. Benavides 2150. Ofic. 803
 Miraflores - Lima
www.capeagro.com

N° de Lote:
 Fecha de Formulación:
 Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto:**100 g****NO CORROSIVO****NO INFLAMABLE****NO EXPLOSIVO**

**MODERADAMENTE PELIGROSO
 DAÑINO**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de dañino, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar (polvo, vapor o aspersión).
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Avermectinas
- En caso de intoxicaciones, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito ni administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece de convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, levantar los párpados y lavar los ojos con abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos. Retirar lentes de contacto si los hubiera y continuar enjuagándolos.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar inmediatamente la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado, mantenerlo en reposo y si fuera necesario brindar respiración artificial.

Nota al médico:

Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

EMERGENCIAS: Llamar a CICOTOX: 0800-13040, CIPROSQUIM: 0800-50847
ESSALUD: 411 8000 anexo 4, CAPEAGRO S.A.C.: 01 445-5346

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Tóxico para las abejas y artrópodos beneficios.
- No aplicar en época de floración del cultivo.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **KOKACHO 30 WG** es un insecticida que actúa por ingestión y contacto sobre el sistema nervioso de los insectos. Tiene una fuerte actividad translaminar en las hojas con gran poder residual.

- Modo de Preparación:

Vierta la dosis del producto en la mitad de la cantidad de agua a aplicar, mezcle el producto agitando y luego agregue el resto del agua hasta completar la cantidad requerida.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN:

Aplicar **KOKACHO 30 WG** (Emamectin benzoate) máximo 1 aplicación por campaña y 2 campañas/año, en presencia de la plaga de haber efectuado una evaluación del campo y considerando el umbral económico del cultivo. Palto: aplicar máximo una (01) aplicación por campaña, una (01) campaña al año. En arándano, aplicar como máximo dos (02) aplicaciones por campaña, considerando una (01) campaña al año. (02) aplicaciones por campaña, en desarrollo vegetativo, floración o fructificación del cultivo, de acuerdo al grado de infestación de la plaga. Se recomienda realizar un gasto de agua de 400 a 600 litros por hectárea de acuerdo a la densidad de plantas por hectárea.

PERIODO DE REINGRESO:

Se puede ingresar al área tratado después de 24 horas.

COMPATIBILIDAD:

El producto es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios comúnmente usados. Sin embargo, se aconseja realizar una prueba de compatibilidad antes de utilizarlo con otros productos.

FITOTOXICIDAD:

No presenta fitotoxicidad en los cultivos, si se siguen las instrucciones recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC* (días)	LMR** (ppm)
	N. común	N. Científico	kg/200L de agua	kg/ha		
Espárrago	"Gusano cogollero"	<i>Spodoptera frugiperda</i>	--	0.050	28	0.01
Páprika	"Gusano perforador grande de la bellota"	<i>Heliothis virescens</i>	--	0.03-0.04	3	0.02
Palto	"Gusano del cesto"	<i>Oiketicus Kirbyi</i>	0.012 - 0.015	0.06 - 0.075	7	0.01
Arándano	"Gusano perforador grande de la bellota"	<i>Heliothis virescens</i>	0.02	--	7	0.01

*P.C.: Periodo de carencia (días)

**L.M.R.: Límite máximo de residuos (partes por millón)

