LEA ESTA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y API ICACIÓN:

- El producto es letal por ingestión, no ingerir
- El producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico :Spinosinas
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta. - No tiene antídoto específico, dar tratamiento sintomático

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CORPORACIÓN GREEN VALLEY S.A.C: 944-434257 SAMU: 106

MANEJO Y DISPOSICIÓN DEDESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase v vierta la solución en la mezcla de aplicación v luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AM.

- Tóxico para abeias y artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración del cultivo.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arrovos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con restos de la aplicación o sobrantes del producto



PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC COMPOSICIÓN Spinosad . Reg. PQUA N° 1641 - SENASA

Titular del Registro: CORPORACIÓN GREEN VALLEY S.A.C

Importado y Distribuido por: CONSORCIO OMNICROP S.A.C

Mza. Ñ lote. 7 urb. Natasha Alta - La Libertad - Truiillo - Truiillo RUC: 20559660796

Fecha de Formulacion: Nº de Lote: Fecha de Vencimiento: Contenido Neto: 250 ml

NO CORROSIVO

Formulado por: SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO., LTD N° 23 Lane 5398 Shenzhuan Road Songiiang District - Shanghai

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

OLYMPUS 120 SC es un insecticida de amplio espectro que actúa por contacto e ingestión, afectando el sistema nervioso central de Spodoptera frugiperda y Heliothis virescens.

OLYMPUS 120 SC se prepara haciendo una premezcla en un cantidad reducida de agua, luego agitar bien y luego agregar el resto de agua en el tanque de aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C.	L.M.R.
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/200 L	L/Ha	(días)	(ppm)
Maíz	Gusano cogollero	Spodoptera frugiperda	0.075	0.15	7	1.0
Pimiento	Gusano perforador	Heliothis virescens	0.1	0.2	1	0.3

LMR: Límites máximos de residuos (PPM: partes por millón)

MOMENTO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Inciar el tratamiento, previa evaluación del cultivo, cuando el nivel de daño económico lo justifique. En ambos cultivos, realizar hasta un máximo de 3 aplicaciones por campaña/cultivo (considerando 1 campaña al año) con intervalo de aplicación de 14 días.

PERIODO DE REINGRESO: Se recomienda no ingresar al campo tratado antes de las 24 horas de realizada la aplicación

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico para los cultivos recomendados en esta etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneia de acuerdo con condiciones e instrucciones dadas















LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO















