

# CYRANO® 75 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**POLVO MOJABLE (WP)**

**COMPOSICIÓN:**

Cyromazina ..... 750 g / Kg  
Aditivos ..... c.s.p. 1 Kg

**Reg. PQUA N° - SENASA**

**TITULAR DEL REGISTRO: CAPEAGRO S.A.C.**



**FORMULADO POR:**

**OASIS AGROSCIENCE LIMITED.**  
Room 1510, N°500 Xinjiang Road,  
Shanghai CHINA

**Importador y  
Distribuidor:**

**CAPEAGRO S.A.C.**  
Calle E. Diez Canseco 333. Of. "E"  
Miraflores - Lima  
[www.capeagro.com](http://www.capeagro.com)

Contenido Neto: **100 g**  
N° de Lote:  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

# LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado no ingerir.
- Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada en la primeras 12 horas después de la aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- Evite almacenar por encima de los 35°C.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice aplicación siguiendo la dirección del viento.

## PRIMEROS AUXILIOS:

### Grupo Químico: Cyromazine, grupo químico de la Triazina

- En caso de ingestión: No inducir al vómito. No administrar nada por la vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.

### EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRELE LA ETIQUETA.

## TELEFONOS DE EMERGENCIA:

ESSALUD: 0801-10200 (línea gratuita)  
CICOTOX: 0800-13040  
CAPEAGRO S.A.C.: 445-5346

## CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para las abejas, u otros artrópodos beneficios.
- No aplicar en época de floración del cultivo.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en la mañana o muy entrada la tarde. Evitar la deriva por el viento.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- el producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- CYRANO 75 WP es un insecticida que actúa por contacto e ingestión sobre el sistema nervioso de los insectos.

### Modo de Preparación:

Vierta la dosis del producto en la mitad de la cantidad de agua a aplicar, mezcle el producto agitando y luego agregue el resto del agua hasta completar la cantidad requerida.

### FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN:

Aplicar CYRANO 75 WP (Cromazina) máximo 2 aplicaciones por campaña, en presencia de la plaga luego de haber efectuado una evaluación del campo y considerando el umbral económico del cultivo.

### PERIODO DE REINGRESO:

Se puede ingresar al área tratada después de 24 horas.

### COMPATIBILIDAD:

El producto es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios comúnmente usados.

### FITOTOXICIDAD:

En los diferentes ensayos de campo realizados con la sustancia activa no se han detectados respuestas fitotóxicas a las dosis recomendadas de aplicación. Por lo tanto no son de esperar reacciones fitotóxicas derivadas de la aplicación del producto.

### RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

## "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS kg/200L de agua	PC* (días)	LMR** (ppm)
	N. común	N. Científico			
Papa	"Mosca minadora"	<i>Lyriomiza huidobrensis</i>	0.07	21	0.8

\*P.C.: Periodo de carencia (días)

\*\*L.M.R.: Límite máximo de residuos (partes por millón)

