



1 cm

0.5 cm

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
DEFENSOR 500 EC es un fungicida sistémico y traslaminar de amplio espectro utilizado para el control de "Mancha negra del maíz".
DEFENSOR 500 EC se prepara haciendo una pre-mezcla de la dosis en la mitad del volumen de agua, agitar bien y luego completar con agua hasta obtener el volumen deseado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

- | CULTIVO | PLAGA | | DOSIS
L/Ha | P.C.
(días) | L.M.R.
(ppm) |
|---------|-----------------------|--------------------|---------------|----------------|--|
| | Nombre Común | Nombre Técnico | | | |
| Maíz | Mancha negra del maíz | Phyllachora maydis | 0.2 - 0.25 | 7 | 0.05 ¹
0.05 ² |

P.C.: Periodo de carencia (días) L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón)

- (1) Difenoconazole (2) Propiconazole

(1) Difenoconazole (2) Propiconazole

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Realizar hasta 2 aplicaciones por campaña/cultivo, cuando se observe los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones ambientales sean propicias para el desarrollo de la misma.

- PERIODO DE REINGRESO:** Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de las 24 horas de realizada la aplicación.

PERIODO DE REINGRESO: Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de las 24 horas de realizada la aplicación.

- COMPATIBILIDAD:** DEFENSOR 500 EC es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso frecuente, a excepción de aquellos de reacción alcalina y agentes oxidantes.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

NO EXPLOSIVO



NEGRO C:0 M:0 Y:0 K:100