

ADAMA

Pratico[®]

SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA -INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN

Flutriafol 200 g/L

Imidacloprid 250 g/L

Aditivos c.s.p.1L

Reg. PQUA N° XXXX - SENASA

Titular del Registro: **ADAMA Agriculture Perú S.A.**

Formulado por:
ADAMA Brasil S/A
R. Pedro Antonio de Souza 400.
Londrina - PR, Brasil.

Importado y Distribuido por:
ADAMA Agriculture Perú S.A.
Av. El Derby N° 254 Of. 503.
Santiago de Surco. Lima - Perú.
Teléfono: (01) 641-0000

Contenido neto: **4 LITROS**

Lote No.

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO

CUIDADO

Cara

Dimensiones: 150 mm x 140 mm
Esta etiqueta requiere Hoja Informativa

LEA LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber, o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien cerrado y etiquetado.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas y/o forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Después de usar el producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Triazoles + Neonicotinoides
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos manteniendo el párpado bien abierto.
- En caso de inhalación, llevar al paciente a un lugar con aire fresco.
- En caso de contacto con la piel, quitar las ropas contaminadas, lavar la zona expuesta con agua y jabón.
- Nota al médico:** Se desconoce antídoto específico. Tratamiento sintomático y de soporte.
- Teléfonos de Emergencia (líneas gratuitas- 24 horas): CISPROQUIM 080-050-847; CICOTOX 0800-1-3040; INFOSALUD 0800-10-828

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No aplicar en época de floración del cultivo.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Pratico SC es un plaguicida sistémico de amplio espectro de acción que debido a la combinación de sus ingredientes activos posee excelentes propiedades fungicidas-insecticidas. **Pratico SC** es rápidamente absorbido por las raíces o partes verdes de las plantas y translocado hasta las hojas.

Agite el envase antes de abrir. Durante la preparación de la mezcla y aplicación del producto en campo mantener siempre en marcha el sistema de agitación. Realizar la aplicación a la base del tronco, con mochila manual de boquilla regulable. La boquilla deberá estar graduada en un ángulo cerrado que genere gotas gruesas que asemejen un chorro de agua.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS (L/ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Café	Roya del cafeto	Hemileia vastatrix	2.0 - 2.5*	120	0.15/t ¹

P.C.: Período de Carencia

LMR : Límite Máximo de Residuos

1-Flutriafol/ 2-Imidacloprid

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar Pratico SC (i.a. flutriafol + imidacloprid) hasta dos aplicaciones por campaña como máximo, considerando una frecuencia entre aplicaciones no menor a 30 días.

Utilizar la dosis más baja en aplicaciones preventivas o cuando se reporten los primeros síntomas de la enfermedad.

Se puede aplicar en cualquier etapa fenológica del cultivo.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de insecticidas y fungicidas de uso común en agricultura a excepción de materiales fuertemente alcalinos.

Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Contracara