

Pantone 2747 Pantone 347 Pantone Cyan
Pantone Black Pantone Yellow

30 x 15 cms

LEER ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENER EL PRODUCTO BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar el producto.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Strobilurin + Phenylpyrrole
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- Este producto no tiene antidoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de ingestión, no inducir el vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón durante 15 a 20 minutos.
- En caso de inhalación, trasladar a la persona al aire libre. Mantenerla en reposo y abrigada. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- En caso de contacto con los ojos, levantar los párpados y lavar los ojos con abundante agua durante 15 minutos. Retirar los lentes de contacto si los hubiera y continuar enjuagando.
- No hay antidoto específico. Tratamiento es sintomático.
- EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR A: ECICOTOX: 080013040
ESSALUD: 0801-10200 (Línea gratuita)
Syngenta Crop protection S.A. Sucursal Peru: 0800-50876

MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Después de usar el contenido, enjuagar tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL AMBIENTE

- Uso exclusivo en almacenes o ambientes cerrados
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



GRADUATE®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRICOLA

Suspensión Concentrada - SC

Composición
Azoxystrobin 238.96 g/L
Fludioxonil 238.96 g/L
Aditivos c.p.s 1 L

Reg. PQUA N°.....-SENASA

Titular del Registro:
Syngenta Crop Protection S.A. Sucursal Perú
Av. Manuel Olguín 335 Of. 808, Urb. Los Granados
Santiago de Surco, Lima.
Línea Gratuita de Servicio al Cliente: 080050876

Importado y Distribuido por:

TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO S.A.
Calle René Descartes No 311
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate.
Lima - Perú
Telf: 612-6565, Fax: 348-1020
R.U.C N° 20307150981

Formulado por:

Syngenta Crop Protection LLC
Estados Unidos

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

Lote N°:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

Contenido Neto:

1 Litro

syngenta®

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

GRADUATE® es un fungicida sistémico y de contacto. Inhibe la germinación de las esporas y el desarrollo micelial del hongo.

Para la preparación de GRADUATE®, echar la cantidad a utilizar en la mitad del volumen de agua a aplicar, agitar bien hasta obtener una solución estable y completar la cantidad de agua.

GRADUATE® es aplicado a los frutos ya cosechados, por inmersión (drenchado) previo a la línea de proceso; asegurándose que todos los frutos sean cubiertos por la solución.

“Consulte con un Ingeniero Agrónomo”

CULTIVO	Plagas		DOSIS (ml/100l)	P.C. (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO			
Mandarina	moho azul	<i>Penicillium italicum</i>	150	0	*15/**10

P.C.: Periodo de Carencia

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos

* Azoxystrobin ** Fludioxonil

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

- Tratamiento post-cosecha, realizar una aplicación tan pronto sea posible después de la cosecha; idealmente dentro de las primeras 24 horas.

PERIODO DE REINGRESO:

- No aplica por tratarse de una aplicación post-cosecha por inmersión de frutos.

COMPATIBILIDAD:

- Es conveniente antes de realizar cualquier mezcla, efectuar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:

- Tratamiento post-cosecha directo al fruto, por lo tanto no hay efectos de fitotoxicidad.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

