Pantone 2747 Pantone 347 Pantone Cyan
Pantone Black Pantone Yellow

43 x 15 cms

LEER ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENER EL PRODUCTO BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Este producto es dañino, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar el producto.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS
- Grupo Químico: Strobilurin + Phenylpyrrole
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de ingestión, no inducir el vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón durante 15 a 20 minutos.
- En caso de inhalación, trasladar a la persona al aire libre. Mantenerla en reposo y abrigada. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- En caso de contacto con los ojos, levantar los parpados y lavar los ojos con abundante agua durante 15 minutos. Retirar los lentes de contacto si los hubiera y continuar enjuagando.
- No hay antídoto específico. Tratamiento es sintomático.
- EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR A: CICOTOX: 080013040
  ESSALUD: 0801-10200 (Línea gratuita)
  Syngenta Crop protection S.A. Sucursal Peru: 0800-50876

MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS
- Después de usar el contenido, enjuagar tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y depósitelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

ECONOMIA SEGURIDAD TRIPLE LAVADO AMBIENTE

MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL AMBIENTE
- Uso exclusivo en almacenes o ambientes cerrados
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

GRADUATE®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRICOLA

Suspensión Concentrada - SC

Composición
Azoxystrobin ..... 238.96 g/L
Fludioxonil ..... 238.96 g/L
Aditivos ..... c.p.s 1 L

Reg. PQUA Nº.....-SENASA

Titular del Registro:
Syngenta Crop Protectión S.A. Sucursal Perú
Av. Manuel Olguín 335 Of. 808, Urb. Los Granados
Santiago de Surco, Lima.
Línea Gratuita de Servicio al Cliente: 080050876

Importado y Distribuido por:
TQC
TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO S.A.
Calle René Descartes No 311
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate.
Lima– Perú.
Telf.: 612-6565, Fax: 348-1020
R.U.C N° 20307150981

Formulado por:
Syngenta Crop Protection LLC
Estados Unidos

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

Lote Nº.:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

Los nombres de producto que contengan ® o ™ , El logo SYNGENTA y el marco CP FRAME Son marcas comerciales de una Compañía del Grupo Syngenta

5 Litros

syngenta®

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
GRADUATE® es un fungicida sistémico y de contacto. Inhibe la germinación de las esporas y el desarrollo micelial del hongo.
Para la preparación de **GRADUATE**®, echar la cantidad a utilizar en la mitad del volumen de agua a aplicar, agitar bien hasta obtener una solución estable y completar la cantidad de agua.
GRADUATE®. es aplicado a los frutos ya cosechados, por inmersión (drenchado) previo a la línea de proceso; asegurándose que todos los frutos sean cubiertos por la solución.

"Consulte con un Ingeniero Agrónomo"

CULTIVO	Plagas		DOSIS (ml/100l)	P.C. (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO			
Mandarina	moho azul	*Penicillium italicum*	150	0	*15/**10

P.C.: Periodo de Carencia **L.M.R.:** Límite Máximo de Residuos
* Azoxystrobin ** Fludioxonil

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN
- Tratamiento post-cosecha, realizar una aplicación tan pronto sea posible después de la cosecha; idealmente dentro de las primeras 24 horas

PERIODO DE REINGRESO:
- No aplica por tratarse de una aplicación post-cosecha por inmersión de frutos.

COMPATIBILIDAD:
- Es conveniente antes de realizar cualquier mezcla, efectuar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:
- Tratamiento post-cosecha directo al fruto, por lo tanto no hay efectos de fitotoxicidad.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características fisico quimicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aqui recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

GR 08 16

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO