

14.5 cm x 29.2 cm

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos y si el contacto fuese por la piel lávese con abundante agua limpia y jabón.

Nota al médico: Tratamiento sintomático si aparece diarrea. No se recomienda el lavado gástrico a menos que se haya ingerido grandes cantidades.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**

**SAMU: 106**

**COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL S.A.C.: 01- 255-2830**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.



REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRÍCOLA

**CONCENTRADO SOLUBLE (SL)**

**Composición:**

Giberelinas ..... 21.04 g/L  
 Citoquininas ..... 20.61 g/L  
 Aditivos ..... c.p.s. 1L

Reg. PBUA N° 110-SENASA

Titular de Registro, Formulador y Distribuidor:



Av. Benavides 1579. 7mo piso. Oficina 702. Edificio Del Park II. Lima 18 - Perú  
Telf.: (01) 255-2830 / atencionalcliente@grupoandina.com.pe

**Contenido Neto: 1L**

N° de Lote:  
 F. de Form:  
 F. de Venc:  
 ® Marca registrada

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

Citogib® es un Regulador de Crecimiento de plantas a base de Citoquininas y Giberelinas, las cuales tienen por efecto el desarrollo uniforme de los frutos. Además permite la elongación y división celular obteniéndose así tallos bien conformados.

Modo de empleo: Se elabora la mezcla disolviendo la cantidad recomendada del producto en un recipiente con agua. Luego, se transfiere la solución al cilindro o mochila de aplicación, según corresponda, y se añade agua hasta alcanzar el volumen necesario. Es importante agitar bien la mezcla antes de proceder con la aplicación.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

Cultivo	Momento de aplicación (antes de cosecha)	Dosis en 200 L agua	P.C. (días)	LMR (ppm)
Alcachofa	20 - 25 días	125 ml	N.A.	N.A.
Ajo	30 días	150 ml	N.A.	N.A.
Arándano	30 días	80 - 100 ml	N.A.	N.A.
Arroz	45 días	30 ml	N.A.	N.A.
Cebolla Amarilla	25 - 30 días	125 ml	N.A.	N.A.
Cebolla Roja	20 - 25 días	125 ml	N.A.	N.A.
Haba	25 días	125 ml	N.A.	N.A.
Melón	15 - 20 días	125 ml	N.A.	N.A.
Papa	20 - 25 días	125 ml	N.A.	N.A.
Paprika	20 - 25 días	125 ml	N.A.	N.A.
Sandía	20 - 25 días	200 ml	N.A.	N.A.
Zapallo	20 - 25 días	125 ml	N.A.	N.A.
Palto	25 - 30 días	80 - 100 ml	N.A.	N.A.

LMR: Límite Máximo de Residuos PC: Periodo de carencia N.A.: No aplica

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Se recomienda el uso del producto 15 a 45 días antes de la cosecha. Realizar de 1 a 2 aplicaciones por campaña.

**PERIODO DE REINGRESO**

No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

Citogib® es compatible con la mayoría de plaguicidas agrícolas, excepto con los agentes oxidantes fuertes. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD**

Citogib® no es fitotóxico a las dosis y usos recomendados en esta etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



**PRECAUCIÓN**



1.3 cm

Banda verde Pantone 347 C

Fondo Citogib Pantone 1795C

Logo caisac Pantone 711 C

Logo caisac Pantone 2945 C