“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- El producto es irritante para los ojos, la piel o el aparato respiratorio.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel o por inhalación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Dinitroanilinas.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- El médico debe instituir un tratamiento sintomático.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente
- En caso de emergencia llamar a:

ARIS INDUSTRIAL S.A.: (01) 336-5428
CICOTOX: 0800-13040 CIPROSQUIM: 0800-50847 ESSALUD: 117

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

SPUR 400 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN:

Pendimethalin.....400 g/L
Aditivos.....c.s.p. 1 L

Registro PQUA N° 089 - SENASA

Titular del Registro: ARIS INDUSTRIAL S.A.

ARIS INDUSTRIAL

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: ARIS INDUSTRIAL S.A.
Av. Industrial 491, Lima - Perú. Telf.: (01) 336-5428

FORMULADO POR: NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO., LTD.
Domicilio: Xiepu Town, Zhenhai District, Ningbo, Zhejiang Province, China
Oficina Central: 21 Jiangxia St., 315000 Ningbo, China

Contenido Neto **: 4L**
No de Lote :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

SPUR 400 EC es un herbicida del grupo de las Dinitroanilinas, usado en el cultivo de cebolla. Su aplicación es pre-emergente con efecto sobre malezas anuales gramíneas y algunas de hoja ancha.

- Agite bien el envase antes de usar.
- Para la aplicación de **SPUR 400 EC** el suelo debe estar preparado, libre de terrones y residuos de cosechas pasadas.
- Evitar la aplicación en condiciones de temperatura mayores a 30°C.
- Recomendamos regular el pH del agua a 5, que es el que requiere el Pendimethalin para cumplir con sus características de control.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	MALEZAS		Dosis		PC (días)	LMR (días)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/ha	L/200 L		
Cebolla	Yuyo Pata de gallina Hierba de gallinazo	*Amaranthus dubius* *Eleusine indica* *Chenopodium murale*	2-3	1-1.5	60	0.1
Pimiento	Hierba de gallinazo Pata de gallina Chamico Verdolaga	*Chenopodium murale* *Eleusine indica* *Datura stramonium* *Portulaca oleracea*	2-3	-	70	0.05
Alcachofa	Hierba de gallinazo Pata de gallina Chamico Pega - pega Verdolaga	*Chenopodium murale* *Eleusine indica* *Datura stramonium* *Setaria verticillata* *Portulaca oleracea*	2-3	-	90	0.05
Espárrago	Yuyo Hierba del gallinazo Capuli cimarron Verdolaga Pega - pega	*Amaranthus dubius* *Chenopodium murale* *Nicandra physalodes* *Portulaca oleracea* *Setaria verticillata*	2*	-	60	0.05
Maíz	Verdolaga Hierba de gallinazo Pata de gallina	*Portulaca oleracea* *Chenopodium murale* *Eleusine indica*	2-3**	-	70	0.05
Vid	Amor seco Hierba del gallinazo Verdolaga Yuyo Pega – pega Capuli cimarrón Grama china	*Bidens pilosa* *Chenopodium murale* *Portulaca oleracea* *Amaranthus dubius* *Setaria verticillata* *Nicandra physalodes* *Sorghum halepense*	3	-	60	0.05
Mandarina	Hierba de gallinazo Lechera Pata de gallina Pega-pega Yuyo	*Chenopodium murale* *Euphorbia heterophylla* *Eleusine indica* *Setaria verticillata* *Amaranthus dubius*	-	1.5-2	-	0.05

PC: Período de Carencia en días. LMR: Límite Máximo de Residuos expresados en ppm.
*Para un volumen de agua de 350 L/ha. **Para un volumen de agua de 400 L/ha.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Su modo de uso lo restringe para aplicaciones al inicio de la campaña.
SPUR 400 EC puede ser aplicado en condiciones de pre-emergencia o en post-emergencia temprana en el cultivo recomendado, es decir, una aplicación por campaña.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas durante 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los herbicidas de uso común e incompatible con agentes oxidantes y productos de reacción alcalina y plaguicidas que no son herbicidas.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a las dosis y usos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.