DIPRID 350 SC®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada SC

Reg. PQUA N° 930- SENASA

2.0 cm

15.0 cm

" LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Evite el contacto con la piel, ojos y ropa.
 Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No fumar, comer ni beber durante la manipulación y uso de este producto.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para el almacenaje de alimentos o agua o bebidas.
- No almacenar, ni transportar junto con animales, bebidas, medicinas y/o forrajes.
- Conserva el producto dentro del envase original, etiquetado y cerrado
- Guardar en un lugar seco, con buena ventilación y en la sombra.
 Aplicar siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXII IOS

Grupo Químico Neonicotinoides

- En caso de intoxicación, inmediatamente llamar a un médico, mientras tanto alejar al afectado de la zona de peligro.
- En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua manteniendo los párpados bien abiertos, durante 15-20 minutos. Si el contacto fuese directo con la piel, retirar la ropa y lave con abundante aqua y jabón.
- En caso de inhalación trasladar al afectado al aire libre y si es necesario aplicar respiración artificial.
- En caso de ingestión llame inmediatamente a un médico, suministre un vaso de agua al paciente, NO inducir al vómito.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y
- muestrele la copia de esta etiqueta.

 No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático.

En caso de emergencia llamar a: CICOTOX Telf: 0800-1-3040 (Atención 24 horas) ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 Opción 4

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido enjuagar el envase 3 veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación. Luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en sitios destinados por las autoridades.

 Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para las abejas y artrópodos benéficos.
 Peligroso para organismo acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- El aplicador debe emplear las medidas necesarias para controlar la deriva.
 Respetar una banda de 5 m hacia fuentes de agua.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos

Jr. Las Poncianas N°147 Interior 2B Urb. La Molina vieja. La Molina - Lima Teléfono: 016522182 Kinyield Industry Co. Limited

Dirección: Unit 905, Workingberg Commercial Building 41-47, Marble Road, Hong Kong, China. Importador y Distribuidor



Contenido Neto: 200 L N° Lote: Fecha de Formulación: Fecha de Vencimiento:

Composición:

Imidacloprid ..

FITOCORP SAC

Aditivos

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

DIPRID 350 SC es un insecticida sistémico, translaminar para ser aplicado en el control de la Prodiplosis longifila la "Mosquilla de los brotes". Actúa por ingestión y contacto

Preparación Mezcla: Vierta la cantidad de DIPRID 350 SC en un tanque de mezcla que contenga hasta la mitad, luego complete el volumen de agua y agite la mezcla hasta que sea homogénea.

"CONSULTE A UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS		P.C.	L.M.R.
	Nombre Común	Nombre Científico	L/cil 200L	L/Ha	(días)	(ppm)
Pimiento	Mosquilla de los brotes	Prodiplosis Iongifila	0.150- 0.200	-	3	0.5
Cebolla	Thrips	Thrips tabaci	0.200	-	3	0.1
Palto	Queresa	Fiorinia fiorinae	0.150	-	7	1.0
Vid	Cochinilla harinosa	Planococcus ficus	-	1.50	14	1.0

P.C: Periodo de carencia

350 gr/ L

c.s.p. 1L

NO EXPLOSIVO

LMR: Límite Máximo de Residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Puede ser aplicado como máximo hasta 3 veces por campaña. Aplicar a los primeros

PERIODO DE REINGRESO

Se recomienda no reingresar antes de 24 horas al campo tratado.

COMPATIBILIDAD

DIPRID 350 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. Es incompatible con productos alcalinos.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en los cultivos si se emplea las dosis indicadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e







MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO























