

**“LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA
INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE
USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA
DE ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada hasta 7 días después para no dañar la germinación y emergencia de las plántulas. Evitar el contacto con los ojos, piel y ropa. En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y la hoja informativa adjunta. En caso de emergencia llamar gratis a: **CICOTOX: 0800-1-3040. ESSALUD: 0800-1-0200.**



Contenido neto : 500 ml
Lote N° :
Fecha de formulación :
Fecha de vencimiento :

COBIJO®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA PARA TRATAR SEMILLAS - FS

Composición:

Fipronil..... 190 g/L
Thiamethoxam..... 350 g/L
Aditivosc.s.p. 1L

Reg. PQUA N° - SENASA

Titular del registro: HORTUS S.A.

Formulado por:



Almirante Pastene 300, Providencia
Santiago - Chile
Teléfono: (56-2) 24706800
Fax: (56-2) 24689100

Importado y distribuido por:



Calle Sucre 270, Ate. Lima, Perú
Telf.: 717-9040 / 717-9041 / Fax: 718-8684
R.U.C. 20101637221
RU N° 141097

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

COBIJO es un insecticida para el tratamiento de semillas de maíz cuyo efecto combinado proporciona una amplia protección contra “Gusanos de tierra” como *Agrotis ipsilon*. El Fipronil actúa por contacto e ingestión mientras que Thiamethoxam tiene alta actividad sistémica por el follaje y raíces.

Para realizar la aplicación de **COBIJO** es recomendable hacer una prueba para determinar la cantidad de líquido necesario para cubrir la superficie de la semilla. Si la semilla es pequeña, podría utilizarse la dosis recomendada sin mezclar con agua. Si las semillas son grandes es posible que se requiera incrementar a la dosis una pequeña cantidad de agua para una buena cobertura.

Cuando se usa líquido adicional, previamente se rocía el agua sobre la superficie de las semillas y luego se agrega el producto formulado puro. Se remueve las semillas, hasta lograr una impregnación uniforme.

El color rojo del producto formulado facilita ver cuándo se ha impregnado uniformemente.

Luego hacer orear las semillas hasta que seque por completo. Finalmente, proceda a la siembra.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	P L A G A		D O S I S		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	(L/kg semilla)	(L/Ha)		
Maíz	Gusano de tierra	<i>Agrotis ipsilon</i>	0.01 - 0.012	0.2 - 0.24	N.A.	0.02 ⁽¹⁾ 0.3 ⁽²⁾

PC: Periodo de carencia en días.

LMR: Límite máximo de residuo en ppm.

(1) Fipronil.

(2) Thiamethoxam.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

