

MICLONIL[®] 40 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN:

Myclobutanil 400 g/Kg
Aditivos c.s.p 1 Kg

Reg. PQUA N° 1615 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:
CAPEAGRO S.A.C.



FORMULADO POR:
OASIS AGROSCIENCE LIMITED.
Room 1510, N°500, Xinjian Road,
Shanghai CHINA

**IMPORTADOR Y
DISTRIBUIDOR:**

CAPEAGRO S.A.C.
Av. Benavides 2150. Ofic. 803
Miraflores - Lima
www.capeagro.com

Contenido Neto: **250 g**

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es dañino no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Utilizar equipo de protección durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 36 horas.
- Después de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes y jabón.
- Almacenar el producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.
- Mantenga alejado el producto del alcance de los niños.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

PRIMEROS AUXILIOS:

GRUPO QUÍMICO: TRIAZOLE

- En caso de ingestión: Llame o acuda a un médico inmediatamente y de información de la etiqueta. No inducir al vómito a no ser que sea voluntario o recomendado por el médico.
- En caso de inhalación: Llevar al paciente a un lugar sombreado, con aire fresco. Si no respira, brindar respiración artificial boca a boca. Solicitar asistencia médica.
- En caso de contacto con los ojos: Lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- Si la irritación persiste, acudir al médico.
- En caso de contacto con la piel: Quite la ropa contaminada y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón. Si la irritación o dolor persiste, acudir al médico.
- Este producto no tiene antídoto específico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIAS:

Llamar a CAPEAGRO S.A.C.: 445-5346

CICOTOX: 328-7398 anx. 481.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- No aplicar en producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

- **MICLONIL 40 WP** es un fungicida de acción sistémica. Actúa alterando la membrana celular impidiendo la síntesis de ergosterol, al extraer un grupo C14-metilo al 24-metilenedihidrolanosterol.
- **MICLONIL 40 WP** inhibe este paso e interrumpe la síntesis de aquel compuesto que forma parte de la membrana celular de los hongos.

Modo de preparación:

Llenar el tanque de preparación hasta la mitad con agua y agregar la dosis requerida de MICLONIL 40 WP, luego completar con agua hasta el volumen recomendado, manteniendo siempre agitación constante. Lavar el equipo antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Realizar dos aplicaciones al año, cuando la plaga esté presente.

PERIODO DE REINGRESO:

El reingreso al área tratada es de 36 horas o hasta que el rocío de la aplicación haya secado, si es necesario ingresar antes, debe utilizar el equipo de protección completo.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con plaguicidas comúnmente usados en los cultivos indicados en la etiqueta.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico en los cultivos en que se recomienda, si se utiliza de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC* (días)	LMR** (ppm)
	N. común	N. Científico	Kg/200L de agua	Kg/Ha		
Paprika	"Oidium"	<i>Leveillula taurica</i>	--	0.3-0.4	2	0.5
Vid	"Oidiosis"	<i>Erysiphe necator</i>	0.024-0.040	--	14	3
Arroz	"Sarocladium"	<i>Sarocladium orizae</i>	--	0.1-0.125	15	0.02

*P.C.: Periodo de carencia **L.M.R.: Límite máximo de residuos

