

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Respete el etiquetado para los seres humanos.
- Este producto es de cultivo. No ingerir.
- Este producto es de cultivo. No ingerir.
- Causa irritación al polvo o la aspersión.
- No usar ni ingerir durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto original, etiquetado y envasado.
- Después de usar este producto camuflarse, lavar la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora al manipular y aplicar y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Ningún envasado que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- **GRUPO QUÍMICO: CHLOROTHALONIL**
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial de ser necesario.
- Este producto no tiene antidoto específico. El tratamiento sintomático y de soporte.

ESSALUD: 0800-10-828  
 - Telefonos de emergencia llamar a:  
 CICOTOX: 0800-1-3040 (Atención 24 horas)  
 AGROLAC ANDINA E.I.R.L. 425-6487/261-5227

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios designados por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.  
 No aplicar en época de floración de cultivo.  
 No aplicar en presencia de polinizadores.  
 No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos adyacentes.  
 Aplicar temprano en las mañanas o las tardes. Evitar la deriva por el viento.  
 Notificar a los apicultores cercanos, días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.  
 Peligroso para organismos acuáticos.  
 No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.  
 No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.  
 Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 mt.  
 Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir el ingreso de animales al campo de cultivo.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

**Cuadro de usos**

CULTIVO	PLAGA		
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	DOSIS (kg/CULT.)
ESPARRAGO	Mancha del peral	<i>Semipylum vesicarium</i>	0,8
			7
			0,01

PC: Período de Carenza.  
 LMR: Límite Máximo de Residuos.

El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.  
 El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.  
 En caso de derrames el producto debe ser recolectado inmediatamente y un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

GROLAC es un fungicida de amplio espectro para tratamientos preventivos y curativos.  
 Para su aplicación mezclar con agua la cantidad necesaria de GROLAC. Aplicar con cualquier equipo de aspersión terrestre, tratando en lo posible de hacer una aplicación uniforme.  
 Las aplicaciones foliares deben ser preventivas cuando se presenten las condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad o cuando se los primeros síntomas de la enfermedad.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Se recomienda aplicar GROLAC (i.a. Chlorothalonil) una aplicación por campaña como máximo. Considerando dos campañas por año. GROLAC puede aplicarse en cualquier etapa fenológica del cultivo excepto en la época de floración.

**PERIODO DE REINGRESO**

No ingrese al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

GROLAC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso agrícola, excepto con los de reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD**

GROLAC no es fitotóxico a los cultivos dosis indicados en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular de Registro garantiza que las características físicas químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.



Medidas en cms.

**GROLAC**  
 FUNGICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA  
 FUNGICIDA AGRÍCOLA  
 POLVO MOJABLE - WP

**COMPOSICIÓN**  
 Chlorothalonil ..... 750 g/Kg  
 Aditivos ..... csp. 1Kg

Reg. PQUA Nº - SENASA

**Titular de Registro:**  
**AGROLAC ANDINA E.I.R.L.**  
 Jr. Yauli 1654 - Of. 103 Lima - Perú  
 Telf.: +(511) 425-6487, 261-5227

**Formulado por:**  
**SINON CHEMICAL (CHINA) CO., LTD.**  
 Dirección: N° 28, Beicium Road, Zhelin Town, Fengxian district, Shanghai, P.R.C.  
 Telf.: 021-57493733, Fax.: 021-57493703.

**Importado y distribuido por:**  
**AGROLAC ANDINA E.I.R.L.**  
 Jr. Yauli 1654 - Of. 103, Lima - Perú.  
 Telf.: +(511) 425-6487, 261-5227.

**Contenido Neto: 500 gr.**  
 Nº Lote  
 F. de Form.  
 F. Venc.  
 NO CORROSIVO  
 NO INFLAMABLE  
 NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO**  
**CUIDADO**