

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de colorado. No ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y envasado.
- Después de usar este producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- No aplicar el producto en la noche.
- No aplicar el producto en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- GRUPO QUÍMICO: CHLOROTRILICO
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al hospital más cercano.
- En caso de ingestión no inducir al vómito.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar fresco.
- Este producto no tiene antidoto específico. El tratamiento sintomático y de soporte.

ESSALUD: 0800-10-6238.
Teléfonos de emergencia llamar a:
CROTOX 0800-1-3242 (Atención 24 horas)
AGROLAC ANDINA E.I.R.L. 425-6487/261-5227

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios designados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

Toxico para abejas y artrópodos benéficos.
No aplicar en época de floración de cultivo.
No aplicar en presencia de polinizadores.
No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos adyacentes.
Aplicar temprano en las mañanas o las tardes. Evitar la deriva por el viento.
Notificar a los aplicadores cercanos, días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
Peligroso para organismos acuáticos.
No contaminar ríos, estuarios o arroyos con los desechos y envases vacíos.
No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
Respetar una banda de no aplicación hacia cuartos de agua de al menos 10 mt.
Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir el ingreso de animales al campo de cultivo.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cuadro de usos

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (kg/CL)	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTÍFICO			
ESPARAGO	Mancha del peral	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.8	7	0.01

P.C.: Período de Curación

LMR: Límite Máximo de Residuos

El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
En caso de derrames el producto debe ser recolectado inmediatamente y un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

GROLAC es un fungicida de amplio espectro para tratamientos preventivos y curativos.
Para su aplicación mezclar con agua la cantidad necesaria de GROLAC. Aplicar con cualquier equipo de aspersión terrestre, tratando en lo posible de hacer una aplicación uniforme.
Las aplicaciones foliares deben ser preventivas cuando se presenten las condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad o cuando se los primeros síntomas de la enfermedad.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar GROLAC (i.e. Chlorothalonil) una aplicación por campaña como máximo. Considerando dos campañas por año. GROLAC puede aplicarse en cualquier etapa fenológica del cultivo excepto en la época de floración.

PERIODO DE REINGRESO

No ingrese al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

GROLAC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso agrícola, excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

GROLAC no es fitotóxico a los cultivos dosis indicados en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

GROLAC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN

Chlorothalonil 750 g/Kg
Aditivos csp. 1Kg

Reg. PAUA N° - SENASA

Titular de Registro:
AGROLAC ANDINA E.I.R.L.

Jr. Yauli 1654 - Of. 103 Lima - Perú
Telf: +(511) 425-6487, 261-5227

Formulado por:
SINON CORPORATION.

Dirección: 23. Sec. 1, Mei Chuan W. Rd., Taichung, 40357 Taiwan R.O.C.
Telf: 886-4-23726181, Fax: 886-4-23750574.

Importado y distribuido por:
AGROLAC ANDINA E.I.R.L.

Jr. Yauli 1654 - Of. 103, Lima - Perú.
Telf.: +(511) 425-6487, 261-5227.

Contenido Neto: 25 Kg.

N° Lote

F. de Form.

F. Venc.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



Medidas en cms.