

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Posible carcinógeno para los seres humanos.
- Este producto es de cuidado. No ingerir.
- Evite respirar el polvo o la aspersión.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y envasado.
- Después de usar este producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar, al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

GRUPO QUÍMICO: CHLORONITRILLO

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial de ser necesario.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento sintomático y de soporte.
- ESSALUD: 0800-10-828.
- Teléfonos de emergencia llamar a:
- CICOTOX: 0800-1-3040 (Atención 24 horas).
- AGROLAC ANDINA E.I.R.L. 425-6487/261-5227

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS
Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACIÓN DEL
AMBIENTE

Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
No aplicar en época de floración de cultivo.
No aplicar en presencia de polinizadores.
No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
Aplicar temprano en las mañanas o las tardes. Evitar la deriva por el viento.
Notificar a los apicultores cercanos, días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
peligroso para organismos acuáticos.
No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 mt.
Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir el ingreso de animales al campo de cultivo.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cuadro de usos

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (Kg/CIL.)	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
ESPARRAGO	Mancha del peral	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.8	7	0.1

PC: Período de Carenacia.

LMR: Límite Máximo de Residuos.

El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

En caso de derrames el producto debe ser recopilado inmediatamente y un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

GRONIL es un fungicida de amplio espectro para tratamientos preventivos y curativos.

Para su aplicación mezclar con agua la cantidad necesaria de GRONIL.

Aplicar con cualquier equipo de aspersión terrestre, tratando en lo posible de hacer una aplicación uniforme.

Las aplicaciones foliares deben ser preventivas cuando se presenten las condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad o cuando se los primeros síntomas de la enfermedad.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar GRONIL (i.a. Chlorothalonil) una aplicación por campaña como máximo. Considerando dos campañas por año. GRONIL puede aplicarse en cualquier etapa fonológica del cultivo excepto en la época de floración.

PERIODO DE REINGRESO

No ingrese al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación

COMPATIBILIDAD

GRONIL es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso agrícola, excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

GRONIL no es fitotóxico a los cultivos dosis indicados en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

GRONIL

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRICOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN

Chlorothalonil 750 g/Kg
Aditivos csp. 1Kg

Reg. PQUA N° 1664 - SENASA

Titular de Registro:

AGROLAC ANDINA SAC

Jr. Saenz Peña 344 Dpto 105 Magdalena del Mar Lima 17 - Perú

Telf: +(511) 425-6487, 261-5227

Formulado por:

SINON CORPORATION.

23, Sec. 1, Mei Chuan W. Rd., Taichung, 40357 Taiwan R.O.C.

Telf: 886-4-23726181, Fax.: 886-4-23750574.

Importado y distribuido por:

AGROLAC ANDINA SAC

Jr. Saenz Peña 344 Dpto 105 Magdalena del Mar Lima 17 - Perú

Telf.: +(511) 425-6487, 261-5227.

Contenido Neto: 25 Kg.

N° Lote

F. de Form.

F. Venc.

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



Medidas en cms.