

**“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- El producto causa irritación leve a los ojos y la piel.
- Evitar la inhalación del producto durante la aplicación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico: Triazol.
- En caso de intoxicación: llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión: inducir el vómito. En caso de inhalación, trasladar al afectado al aire fresco.
- En caso de contacto con los ojos: lavarlos con abundante agua fresca durante 15 minutos; y si el contacto fuese con la piel: lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- **Nota al médico:** No tiene antídoto específico; dar tratamiento sintomático.
- En caso de emergencia llamar a **CICOTOX: 0800-1-3040. ESSALUD:117.**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para peces. No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No aplicar en suelos con napa freática superficial.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

**CAPOTE<sup>®</sup>**  
**25 EW**

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**EMULSIÓN - ACEITE EN AGUA - EW**

**Composición:**

Tebuconazole..... 250 g/L

Aditivos ..... c.s.p 1L

**Reg. PQUA N° 1668 - SENASA**

**Titular del registro: HORTUS S.A.**

Calle Sucre N° 270, Ate. Lima, Perú.

Formulado por:



**GLEBA S.A.**  
Avenida 520 y Ruta Prov. 36,  
Melchor Romero - La Plata  
Buenos - Aires  
Tel (Fax) (0221) 4913062/ 6093  
www.gleba.com.ar

Distribuido por:

**Distribuidora Agroveterinaria Trujillo SAC**  
Av. Cesar Vallejo 391 Urb. Palermo – Trujillo – La Libertad  
Telf.: 044-205059  
RUC 20477508147

**Contenido Neto : 10L**

**Lote N° :**

**Fecha de Formulación :**

**Fecha de Vencimiento :**

Importado por:



Calle Sucre 270, Ate. Lima, Perú.  
Telf: 717-9040 / 7179041  
R.U.C. 20101637221  
RU N° 141097

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**CAPOTE 25 EW** es un fungicida sistémico usado en forma preventiva, curativa y erradicante que actúa inhibiendo la síntesis de esteroides en los hongos patógenos. Se aplica antes o durante la aparición de Botrytis, Oidium, Pyricularia y Roya. Los cultivos en que se recomienda son: vid, manzano, mandarina, arroz, espárrago, mango, tomate, papa y café.

**CAPOTE 25 EW**, se aplica como aspersión directa sobre el follaje mediante equipos aplicadores convencionales, usando agua como transportador. Medir la cantidad requerida de **CAPOTE 25 EW** y disolver en el tanque de aplicación con una pequeña cantidad de agua. Completar la cantidad de agua necesaria. Aplicar mediante aspersión.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

| CULTIVO   | ENFERMEDADES     |                                | DOSIS |           | P.C.<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|-----------|------------------|--------------------------------|-------|-----------|----------------|--------------|
|           | Nombre común     | Nombre científico              | L/Ha  | L/200L    |                |              |
| Vid       | Oidium           | <i>Uncinula necator</i>        | 0.30  | 0.06      | 14             | 2.00         |
| Manzano   | Oidium           | <i>Podosphaera leucotricha</i> | 0.40  | 0.08      | 14             | 0.50         |
| Mandarina | Botrytis         | <i>Botrytis cinerea</i>        | 0.75  | 0.15      | 14             | 0.05         |
| Espárrago | Roya             | <i>Puccinia asparagi</i>       | 0.75  | 0.25      | 7              | 0.05         |
| Arroz     | Quemado          | <i>Pyricularia oryzae</i>      | 0.75  | 0.375     | 35             | 2.00         |
| Mango     | Oidiosis         | <i>Oidium mangiferae</i>       | 0.57  | 0.100     | 20             | 0.05         |
| Tomate    | Podredumbre gris | <i>Botrytis cinerea</i>        | -     | 0.25      | 7              | 0.20         |
| Papa      | Tizón temprano   | <i>Alternaria solani</i>       | -     | 0.2-0.3   | 30             | 0.01         |
| Café      | Roya amarilla    | <i>Hemileia vastatrix</i>      | -     | 0.2-0.25* | 30             | 0.1          |

PC: Periodo de Carencia en días

LMR : Límite máximo de residuos en ppm

\* Se sugiere usar la menor dosis en estados iniciales de la enfermedad y la dosis mas alta cuando hay mayor presión de la enfermedad.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Aplicar cuando se presenten las condiciones predisponentes para el desarrollo de estas enfermedades. Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por año.

**PERIODO DE REINGRESO:** 24 Horas para reingresar al sector tratado sin equipo de protección personal.

**COMPATIBILIDAD:** Incompatible con productos extremadamente ácidos o alcalinos (pH<3 y pH >10). En caso de dudas respecto a la compatibilidad del producto, efectuar pruebas en pequeña escala antes de aplicar.

**FITOTOXICIDAD:** No presenta fitotoxicidad en los cultivos en que se recomienda, si se siguen fielmente las instrucciones de la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

