

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
 "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es de cuidado, no ingerir
- Evite contacto con la piel y la ropa
- Causa irritación moderada a los ojos
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa utilizada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- **Grupo Químico: Dinitroanilina**
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele esta etiqueta.
- En caso de ingestión no induzca el vómito. No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua durante 10 a 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado, bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial de ser necesario.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

**TELEFONO DE EMERGENCIAS**  
**CICOTOX: 0800-1-3040 (línea gratuita)**  
**ESSALUD: 0801 - 10200**  
**BASF Peruana S.A.: (01) 513 2505**

**MANEJO Y DISPÓSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido del envase enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.



Conserve el producto sobrante en su envase original bien cerrado. Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reusarse.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# Prowl®400

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA HERBICIDA AGRÍCOLA

**Concentrado Emulsionable (EC)**  
**COMPOSICIÓN:**  
 Pendimethalin..... 400 g/L  
 Aditivos ..... c.s.p. 1 L  
**Reg. PQUA N°**

**TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:**  
**BASF Peruana SA**  
 Av. O. R. Benavides 5915 – Callao  
 Telf: (01) 513 2500  
 Fax: (01) 513 2519



**FORMULADO POR:**  
**Ouro Fino Química Ltda.**  
 Av. Filomena Cartafina 22335 cuadra 14 Lote 5 Distrito Industrial III Uberaba MG – Brasil

**PARA:**  
**BASF S.A.**  
 Av. Brasil, 791  
 Bairro Eng. Neiva Guaratinguetá SP – Brasil

**CONTENIDO NETO: 200 L**

**No. DE LOTE:**

**FECHA DE FORMULACION:**

**FECHA DE VENCIMIENTO:**

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**

® Marca registrada BASF

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

- Prowl®400 es un herbicida del grupo de dinitroanilinas y que actúa inhibiendo la división y elongación celular de los meristemas de raíces y tallos, se recomienda para el control de malezas gramíneas anuales y de hoja ancha en cultivos de hortalizas, anuales y frutales. No controla malezas perennes.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO**

**CUADRO DE USOS:**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/ha	PC* (días)	LMR** (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Ajo	Yuyo	<i>Amaranthus dubius</i>	3.5	60	0.05
	Cola de zorro	<i>Leptochloa filiformis</i>			
Alcachofa	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>	2.0	90	0.05
	Yuyo	<i>Amaranthus hybridus</i>			
	Capulí cimarrón	<i>Nicandra physalodes</i>			
Caña de azúcar	Arrocillo o caminadora	<i>Rottboellia cochinchinensis</i>	2.5	30	0.05
	Moco de pavo	<i>Echinochloa crus-galli</i>			
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>			
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>			
	Pega pega	<i>Setaria verticillata</i>			
	Argemone	<i>Argemone mexicana</i>			
Cebolla	Yuyo	<i>Amaranthus dubius</i>	2.5 - 4.0	60	0.05
	Hierba del gallinazo	<i>Chenopodium ambrosioides</i>			
Espárrago	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>	1.0 - 2.0	n.d.	0.05
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>			
	Hierba del gallinazo	<i>Chenopodium murale</i>			
	Yuyo	<i>Amaranthus dubius</i>			
	Pega pega	<i>Setaria verticillata</i>			
Fresa	Capulí cimarrón	<i>Nicandra physalodes</i>	2.5 - 4.0	60	0.05
	Pega pega	<i>Setaria verticillata</i>			
Maíz	Moco de pavo	<i>Echinochloa crus-galli</i>	3.0 - 3.5	60	0.05
	Arrocillo o caminadora	<i>Rottboellia exaltata</i>			
Pimiento	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>	1.0 - 2.0	n.d.	0.05
	Yuyo	<i>Amaranthus dubius</i>			
	Hierba del gallinazo	<i>Chenopodium murale</i>			
	Paico	<i>Chenopodium album</i>			
	Capulí cimarrón	<i>Nicandra physalodes</i>			

\*PC: Período de carencia \*\*LMR: Límite máximo de Residuos

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:**

- Se recomienda aplicar Prowl®400 (i.a. pendimethalin) una aplicación por campaña como máximo, considerando una campaña al año para todos los cultivos del cuadro de usos.
- En cultivos de siembra directa aplicar inmediatamente después de la siembra (preemergencia de los cultivos y malezas); en cultivos de trasplante aplicar pre-trasplante o pos-trasplante en húmedo.
- Siempre debe ser aplicado sobre suelo mullido antes de la emergencia de las malezas.

**PERIODO DE REINGRESO:**

- Se recomienda no ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:**

- Puede ser mezclado con otros herbicidas selectivos para el cultivo objetivo, se recomienda realizar pruebas previas antes del uso comercial.

**FITOTOXICIDAD:**

Prowl®400 es un herbicida selectivo, es fitotóxico sino se siguen las recomendaciones de uso dadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

"El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
 CUIDADO**

