

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir
- Evite contacto con la piel y la ropa
- Causa irritación moderada a los ojos
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa utilizada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo Químico: Dinitroanilina**
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele esta etiqueta.
- En caso de ingestión no induzca el vómito. No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua durante 10 a 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado, bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial de ser necesario.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELEFONO DE EMERGENCIAS
CICOTOX: 0800-1-3040 (línea gratuita)
ESSALUD: 0801 - 10200
BASF Peruana S.A.: (01) 513 2505

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido del envase enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.

Conserve el producto sobrante en su envase original bien cerrado. Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reusarse.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



Prowl®400

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Emulsionable (EC)
COMPOSICIÓN:
Pendimethalin..... 400 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L
Reg. PQUA N° 1671-SENASA

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
BASF Peruana SA
Av. O. R. Benavides 5915 – Callao
Telf: (01) 513 2500
Fax: (01) 513 2519



We create chemistry

FORMULADO POR:
Ouro Fino Química S.A.
Av. Filomena Cartafina 22335
cuadra 14 Lote 5 Distrito Industrial III Uberaba MG – Brasil

PARA:
BASF S.A.
Av. Brasil, 791
Bairro Eng. Neiva Guaratinguetá SP – Brasil

CONTENIDO NETO: 200 L

No. DE LOTE:

FECHA DE FORMULACION:

FECHA DE VENCIMIENTO:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

® Marca registrada BASF

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- Prowl®400 es un herbicida del grupo de dinitroanilinas y que actúa inhibiendo la división y elongación celular de los meristemas de raíces y tallos, se recomienda para el control de malezas gramíneas anuales y de hoja ancha en cultivos de hortalizas, anuales y frutales. No controla malezas perennes.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/Ha	PC* (días)	LMR** (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Ajo	Yuyo	<i>Amaranthus dubius</i>	3.5	60	0.05
	Cola de zorro	<i>Leptochloa filiformis</i>			
Alcachofa	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>	2.0	90	0.05
	Yuyo	<i>Amaranthus hybridus</i>			
	Capulí cimarrón	<i>Nicandra physalodes</i>			
Caña de azúcar	Arrocillo o caminadora	<i>Rottboellia cochinchinensis</i>	2.5	30	0.05
	Moco de pavo	<i>Echinochloa crus-galli</i>			
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>			
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>			
	Pega pega	<i>Setaria verticillata</i>			
	Argemone	<i>Argemone mexicana</i>			
Cebolla	Yuyo	<i>Amaranthus dubius</i>	2.5 - 4.0	60	0.05
	Hierba del gallinazo	<i>Chenopodium ambrosioides</i>			
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>			
Espárrago	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>	1.0 - 2.0	n.d.	0.05
	Hierba del gallinazo	<i>Chenopodium murale</i>			
	Yuyo	<i>Amaranthus dubius</i>			
	Pega pega	<i>Setaria verticillata</i>			
	Capulí cimarrón	<i>Nicandra physalodes</i>			
Fresa	Pega pega	<i>Setaria verticillata</i>	2.5 - 4.0	60	0.05
	Moco de pavo	<i>Echinochloa crus-galli</i>			
Maíz	Arrocillo o caminadora	<i>Rottboellia exaltata</i>	3.0 - 3.5	60	0.05
Pimiento	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>	1.0 - 2.0	n.d.	0.05
	Yuyo	<i>Amaranthus dubius</i>			
	Hierba del gallinazo	<i>Chenopodium murale</i>			
	Paico	<i>Chenopodium album</i>			
	Capulí cimarrón	<i>Nicandra physalodes</i>			

*PC: Período de carencia **LMR: Límite máximo de Residuos

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

- Se recomienda aplicar Prowl®400 (i.a. pendimethalin) una aplicación por campaña como máximo, considerando una campaña al año para todos los cultivos del cuadro de usos.
- En cultivos de siembra directa aplicar inmediatamente después de la siembra (preemergencia de los cultivos y malezas); en cultivos de trasplante aplicar pre-trasplante o pos-trasplante en húmedo.
- Siempre debe ser aplicado sobre suelo mullido antes de la emergencia de las malezas.

PERIODO DE REINGRESO:

- Se recomienda no ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

- Puede ser mezclado con otros herbicidas selectivos para el cultivo objetivo, se recomienda realizar pruebas previas antes del uso comercial.

FITOTOXICIDAD:

Prowl®400 es un herbicida selectivo, es fitotóxico sino se siguen las recomendaciones de uso dadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".



LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

