

x 15 cm)

CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

ATENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

IONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
ducto es de cuidado, no ingerir.
ar, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
ar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
ar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
enar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
opa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar
stada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
s de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada
con abundante agua y jabón.
envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar
o agua para consumo.
la aplicación siguiendo la dirección del viento.

IONES DE PRIMEROS AUXILIOS:
'químico: Estrobrulinas + Triazoles
' de intoxicación llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al centro
mostrarle la etiqueta.

' de ingestión: No inducir al vómito sin supervisión médica.
' de contacto con la piel: Retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel
dante agua y jabón durante 15 a 20 minutos.
' de inhalación: Trasladar a la persona al aire libre. Mantener en reposo y abrigada.
respiración artificial si fuera necesario.
' de contacto con los ojos: Levantar los párpados y lavar los ojos con abundante
ante 15 minutos. Retirar lentes de contacto si los hubiera y continuar enjuagando.
oducto no tiene antidoto específico: El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106 AGREVO PERUANA S.A.C.: 989-004643

IONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN:
'CHOS Y ENVASES VACÍOS:
envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta
en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o
lo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino
por la autoridad competente, para su gestión.
e el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

S PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:
o para organismos acuáticos
aminar ríos, estanques o arroyos con los desechos de envases vacíos.
aminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
ir una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros
o para animales domésticos flora y fauna silvestre.
ir animales en el área tratada.
cto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales
os altamente permeables.
de derrames, el producto debe ser recolectado inmediatamente y dispuesto
ir seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

SUPERION[®] TOP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición:

Azoxystrobin 200 g/L
Difenoconazole 125 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

PQUA N° 1670 - SENASA

Titular de Registro, Importador y Distribuidor:

AGREVO PERUANA S.A.C.

Jr. San Sebastián 2389

Urb. El Bosque de la Molina II Etapa,

La Molina, Lima - Perú

Teléfono: (01) 6328482

Formulado por:

Shanghai E-Tong Chemical Co., Ltd.

Nº. 23, Lane 5388, Shenzhuan Road Songjiang District

Shanghai, China.

Fecha de Formulación:

Nº de Lote:

Contenido neto: 1 L

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
SUPERION TOP es la combinación de dos fungicidas, Azoxystrobin y Difenoconazole que
le permite controlar un amplio rango de enfermedades. Tiene actividad tanto sistémica
como de contacto.
Para su adecuada aplicación, llenar hasta la mitad el tanque de aplicación luego aplicar
el producto a la dosis recomendada, completar con agua, agitar y aplicar. Realizar una
aplicación uniforme sobre el follaje. Utilizar cualquier equipo terrestre, pulverizadora manual
o atomizadora, siempre y cuando se encuentre en buen estado de funcionamiento y provisto
de boquillas adecuadas (de preferencia del tipo cone vacío).

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC días	LMR ppm
	Nombre común	Nombre científico	L/ha	L/oli		
Cebolla	Queñado	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.3	-	30	10* 0.1
Arroz	Queñado	<i>Pyricularia grisea</i>	0.5	-	28	5** 3**
Arroz	Rhizoctonia	<i>Rhizoctonia solani</i>	0.35	-	28	5**
Vid	Oidium	<i>Erysiphe necator</i>	0.5	-	21	2** 3**
Espárrago	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.30	-	14	2.0
	Mancha púrpura	<i>Stemphylium vesicarium</i>	-	0.2	30	0.1 0.3
Palto	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.8	0.2	14	2** 0.1**
	Muerte Regresiva	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	-	0.10	14	2** 0.6**

PC: Período de carencia

LMR: Límite máximo de residuos LMR: *Azoxystrobin ** Difenoconazole

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar SUPERION TOP (i.e. Azoxystrobin + Difenoconazole) una aplicación por campaña
como máximo, considerando una campaña al año. Debe ser aplicado de forma preventiva o
tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

PERIODO DE REINGRESO:

No reingresar al área tratada antes de las 24 horas posteriores a la aplicación.

COMPATIBILIDAD: SUPERION TOP puede ser mezclado con la mayoría de insecticidas
y fungicidas más comúnmente utilizados.

FITOTOXICIDAD:

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar
fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico
químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la
etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a
las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el
titular de registro o con el distribuidor del producto.

