" LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO ' 1.5 CM " MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS " PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Tóxico por ingestión. Peligroso por inhalación, irritante, al tacto y vías respiratorias, utilizar equipo de protección respiratoria Moderadamente irritante a los ojos, causa daños a los ojos, use protección ocular.

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto No almacenar, ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas y /o forrajes. Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y bañase con abundante agua y jabón. Usar equipo de protección, durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento. Guardar en un lugar seco, con buena ventilación y en la sombra. Conservar el producto dentro del envase original, etiquetado y cerrado. Ningún envase vacío puede utilizarse para almacenar alimentos ni bebidas. - Grupo Químico: Estrobilurina - En caso de intoxicación por ingestión o inhalación. Ilamar inmediatamente al médico o llevar al paciente al médico y llevar la etiqueta. En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca durante 20 minutos y lleve al paciente al En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón durante 15 minutos. Consultar al médico No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente. Nota al médico: Tratamiento sintomático, no existe antidoto específico. TELÉFONO DE EMERGENCIA CETOX Telf.: 0800-7-1911 ESSALUD EN LINEA: 411-8000 Opción 4. AVGUST PERU SAC: 016522182 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS - Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE Peligroso para los organismos acuáticos.
 No contaminar lagos, ríos estanques, o arroyos con los desechos y envases vacios. Respetar una banda de no aplicación hacía cuerpos de agua de al menos 5 metros. Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales. En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Quioxy° 50WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA **FUNGICIDA AGRÍCOLA**

GRANULOS DISPERSABLES - WG

Composición: Azoxystrobin . 500 a/Ka Aditivos .. . c.s.p 1Kg

Reg. PQUA Nº 1215 - SENASA Titular del Registro

AVGUST PERU SAC

Cal. Los Tejedores Nro.187 Urb. Industrial Vulcano Lima-Lima-Ate. Formulado por:

Beta Chemicals Ltd.

Rm.707, Blk. A. Kingsound Center, No. 116 Zizhuvuan Road, Beijing 100097, China

Importador y Distribuidor



Contenido Neto: 100g N° Lote: Fecha de Formulación Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

 Aplicar QUIOXY 50 WG es un fungicida que actúa inhibiendo la producción y germinación de las esporas y el crecimiento del micelio del hongo. Para la preparación de QUIOXY 50 WG, llenar hasta la mitad con agua del recipiente de mezcla, verter la dosis recomendada y comenzar agitar hasta tener una mezcla homogénea. Asegurarse la aplicación con un volumen de agua que cubra la superficie de la planta. Tomar en cuenta que su equipo

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"

001100212 0011 011 111021112110 710110110110						
CULTIVOS	PLAGA		DOSIS		P.C.	L.M.R.
	Nombre Común	Nombre Científico	Kg/Ha	gr/Cil (200 L)	(días)	(ppm)
Pimiento, páprika y ají.	Oidium	Leveillula taurica	-	80	3	2
Vid	Oidiosis	Erysiphe necator	-	40	14	2
Cebolla	Mancha del peral	Stemphylium vesicarium	-	100	2	10
Alcachofa	Oidium	Leveillula taurica	-	80	7	5
Espárrago	Mancha del peral	Stemphylium vesicarium	-	80 a 100	ND	0.05
Mango	Oidiosis	Oidium mangiferae	0.2	-	21	0.7

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

LMR: Limite Máximo de Residuos

- Para una mayor eficiencia, debe ser aplicado de manera preventiva y la observación de los primeros síntomas de la enfermedad, puede ser aplicado hasta 2 veces por campaña, considerando una campaña por año.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada sin usar equipo de protección 24 horas después de la aplicación del producto.

-QUIOXY 50 WG es compatible con la mayoría de los plaguicidas usados, sin embargo, se recomienda efectuar una prueba antes de la mezcla definitiva.

QUIOXY 50 WG no es fitotóxico en los cultivos si se emplea las dosis indicadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

 El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.



7.5 cm



















