

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Anilino pirimidine (cyprodinil), Phenylpyrrole (fludioxonil).
 - En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta.
 - En caso de ingestión, no inducir al vomito. No administrar nada por vía oral si la persona si la persona esta inconsciente o padece convulsiones. En caso de vomito espontaneo, haga que víctima se incline hacia adelante con la cabeza hacia abajo para evitar la inhalación de vomito, enjuáguese la boca y administrar agua. Lleve al paciente inmediatamente al centro medico mas cercano y mostrar la etiqueta.
 - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los parpados estén levantados. Acudir al medica inmediatamente si la irritación persiste.
 - En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y el calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
 - En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Nota al médico: No tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106
RAINBOW AGROSCIENCIAS: 01- 639-9311

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

SHAOLIN es un fungicida específico para combatir el moho gris (*Botrytis cinerea*); sistémico y de contacto, con poder preventivo y curativo, resultante de la acción combinada de dos sustancias activas complementarias.

SHAOLIN puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca (mochila), equipos estacionarios o accionados por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados. Para la aplicación se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad de su capacidad, hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua en un balde o envase, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque de aplicación y complete el volumen de agua a utilizar.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	Plaga		DOSIS Kg/ha	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Pimiento	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.8-1.0	7(1) 7(2)	1.5(1) 0.2(2)
Arándano	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.8	1(1) 1(2)	10(1) 2(2)
Vid	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	1.0	7(1) 7(2)	3.0 (1) 4.0(2)

PC: Período de carencia
1. Cyprodinil 2. Fludioxonil

LMR: Límite máximo de residuos



170mm

130mm