

12,0 ± 0,3



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
FUNGICIDA AGRICOLA
Granulo Dispersable (WG)

Composición:

Cypronidil	375 gr/kg
Fludioxonil	250 gr/kg
Aditivos	c.s.p. 1 Kg

Reg. PQUA N° xxx-SENASA

Titular de Registro :
Rainbow Agrosoluciones S.A.C.

Innovación. Claves. Futuro.

Formulado por: **SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO. LTD**
 6th Floor, Gaixinjishu chuanyue Centre Shunhua Road 750#,
 Jinan, Shandong-China

Importado y Distribuido por: **RAINBOW AGROSOLUCIONES S.A.C.**
 Av. el Polo 401, oficina 610,
 Santiago de Surco - Lima

Contenido Neto: **120 gr**
 N° Lote
 F. de Form.
 F. de Venc.

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

2,4

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de **CIUDADO** no tóxico.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Peligroso si se inhala. Evite respirar polvo o nebulización.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para protegerse al estar en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y lávese con abundante agua y jabón.
- Almacene el producto bajo llave, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para almacenar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS
 Grupo químico: Anilino pirimidine (cypronidil), Phenyloxymol (fludioxonil).

- En caso de intoxicación: llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico más cercano.
- En caso de ingestión: no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padeciera convulsiones. En caso de vómito espontáneo, luego que la víctima se incline hacia adelante con la cabeza hacia abajo para evitar la inhalación de vómito, enjuáguese la boca y adminístrele agua. Lleve al paciente inmediatamente al centro médico más cercano y muestre la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos: Láveselos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Acudir al médico inmediatamente si la irritación persiste.
- En caso de contacto con la piel: retire la ropa y el calzado contaminado. Báñese con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación: retire al paciente de área contaminada y tráaslado a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

Nota al médico: No tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático.

TELEFONOS DE EMERGENCIA
 Eschazul: 801-1000 (Línea gratuita)
 CICOTOX 8-886-1346

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido enjuague tres veces este envase y vacíe la solución en la mezcla de aplicación luego indicarlo al fabricante o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Manipular los envases con cuidado para evitar rupturas y derrames.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en áreas tratadas.
- No contaminar ríos, arroyos o arroyos con los desechos o envases vacíos y restos de aplicación.
- Respetar una banda de no aplicación, hacia cuerpos de agua de al menos 1 metro.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar los ríos.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- SHAOLIN es un fungicida específico para combatir el moño gris (*Botrytis cinerea*), aséptico y de contacto, con poder preventivo y curativo, resultado de la acción combinada de dos sustancias activas complementarias.
- SHAOLIN puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca (mochala), equipos estacionarios o accionados por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados. Para la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad de su capacidad; hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua en un balde o envase, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, verter la mezcla al tanque de aplicación y completar el volumen de agua a utilizar.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PREVENCIÓN		SEÑAL	DÍAS	VECES
	PREVENCIÓN	PREVENCIÓN			
FRUTALES	PREVENCIÓN	PREVENCIÓN	PREVENCIÓN	PREVENCIÓN	PREVENCIÓN
FRUTALES	PREVENCIÓN	PREVENCIÓN	PREVENCIÓN	PREVENCIÓN	PREVENCIÓN
FRUTALES	PREVENCIÓN	PREVENCIÓN	PREVENCIÓN	PREVENCIÓN	PREVENCIÓN

LRA - Lima, México y Panamá PG - Perú de la Amazonia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar SHAOLIN dirigido al follaje del cultivo, cuando esté en estado de floración, previa evaluación de la enfermedad en el cultivo y cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la misma.
- Se recomienda realizar 1 aplicación por campaña como máximo.
- Es importante rotar con insecticidas de otros grupos químicos dentro de un programa de manejo integrado de plagas.

PERIODO DE REINGRESO

- No ingresar las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

- SHAOLIN es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común.

FITOTOXICIDAD

- SHAOLIN No es fitotóxico a las dosis y cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL
 El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

