

13,5 ± 0,3

0,6 ± 0,2 0,6 ± 0,2



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRICOLA

Granulo Dispersable (WG)

Composición:

Cypronidil 375 gr/kg

Fludioxonil 250 gr/kg

Aditivos c.s.p. 1 Kg

Reg. PQUA N° xxx-SENASA

Titular de Registro :
Rainbow Agrosociencias S.A.C.



Formulado por: SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO. LTD
6th Floor, Gaoxinjishu huangyue Centre Shunhua Road 750#,
Jinan, Shandong-China

Importado y Distribuido por: RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C.
Av. el Polo 401, oficina 610,
Santiago de Surco - Lima

Contenido Neto: **200 gr**
N° Lote
F. de Form.
F. de Venc.

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

19,0 ± 0,3

1,8

Medidas en cm.

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO, no ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar (polvo o aspersión).
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacene el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Azoxystrobin (cyprodinil), Phenytyrolate (fludioxonil).
- En caso de Intoxicación: llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y la mostrar etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones. En caso de vómito espontáneo, haga que víctima se incline hacia adelante con la cabeza hacia abajo para evitar la inhalación de vómito, enjuáguese la boca y administrar agua. Lleve al paciente inmediatamente al centro médico más cercano y mostrar la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos: Lávelos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Acudir al médico inmediatamente si la irritación persiste.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y el calzado contaminado. Báñese con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona de área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

Nota al médico: No tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
EsSalud: 801-1026 (línea gratuita)
CICOTOX: 8-888-13460

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego multilicido triturándolo o perforándolo y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Manipular los envases con cuidado para evitar rupturas y derrames.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No contaminar ríos, esteros o arroyos con los desechos o envases vacíos y restos de aplicación.
- Respetar una banda de no aplicación, hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- SHAOLIN es un fungicida específico para combatir el mocho gris (*Botrytis cinerea*), aséptico y de contacto, con poder preventivo y curativo, resultante de la acción combinada de dos sustancias activas complementarias.
- SHAOLIN puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca (mochila), equipos estacionarios o accionados por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados. Para la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad de su capacidad, hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua en un balde o envase, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, verter la mezcla al tanque de aplicación y complete el volumen de agua a utilizar.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

EVALUACIÓN	ENTRENAMIENTO		DISEÑO	PLAQUEO	CULTIVO	Clima	Cosecha
	MANEJO	SEGUIMIENTO					
EMERGENCIA	Manejo	Seguimiento	1-1-12	1	1	1	1

UR: Lima, Perú de la Red de la FAO

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar SHAOLIN dirigido al follaje del cultivo, cuando este se encuentre en estado de floración, previa evaluación de la enfermedad en el cultivo y cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la misma.
- Se recomienda realizar 1 aplicación por campaña como máximo.
- Es importante rotar con insecticidas de otros grupos químicos dentro de un programa de manejo integrado de plagas.

PERIODO DE REINGRESO

- No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

- SHAOLIN es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común.

FITOTOXICIDAD

- SHAOLIN No es fitotóxico a las dosis y cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

