



PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Gránulo Dispersable (WG)

Composición:

Cyprodinil 375 g/kg

Fludioxonil 250 g/Kg

Aditivos c.s.p. 1kg

PQUA N° 1674 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:



RAINBOW AGROSCIENCES SAC
Av. El Polo N°401 Oficina 610
Santiago de Surco, Lima, Perú
Teléfono: (511) 713-9960
rainbowchem@rainbowchem.com
www.rainbowchem.com

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:



Av. Benavides 1579 Oficina 703
Edificio Del Park II
Miraflores
Lima - Perú
Telf.: (01) 253-6444
atencionalcliente@grupoandina.com.pe

FORMULADOR:

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO. LTD.
Binhai Economic Development Area, Weifang
Shandong 262737. China

Contenido Neto: 200 g

Lote N°:

Fecha de Fabricación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

**LEA LA ETIQUETA Y
LA HOJA DE SEGURIDAD ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGA EL PRODUCTO BAJO LLAVE
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Manipular los envases con cuidado para evitar rupturas y derrames.

PERIODO DE REINGRESO

- No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **SHAOLIN** es un fungicida específico para combatir el moho gris (*Botrytis cinerea*); sistémico y de contacto, con poder preventivo y curativo, resultante de la acción combinada de dos sustancias activas complementarias.
- **SHAOLIN** puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca (mochila), equipos estacionarios o accionados por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados. Para la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad de su capacidad, hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua en un balde o envase, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque de aplicación y complete el volumen de agua a utilizar.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS Kg/ha	PC (días)		LMR (ppm)	
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO		Cyprodinil	Fludioxonil	Cyprodinil	Fludioxonil
PIMIENTO	“Moho gris”	<i>Botrytis cinerea</i>	0.8 - 1.0	7	7	1.5	0.2

LMR: Límite Máximo de Residuos

PC: Período de Carencia

