

35.0 cm

“ LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar (polvo o aspersión).
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS.

- Grupo químico: Anilino pirimidine (cyprodinil), Phenylpyrrole (fludioxonil).
 - En caso de Intoxicación; llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar etiqueta.
 - En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones. En caso de vómito espontáneo, haga que víctima se incline hacia adelante con la cabeza hacia abajo para evitar la inhalación de vómito, enjuáguese la boca y administrar agua. Lleve al paciente inmediatamente al centro médico mas cercano y mostrar la etiqueta.
 - En caso de contacto con los ojos, Lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Acudir al médico inmediatamente si la irritación persiste.
 - En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y el calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
 - En caso de inhalación, retirar a la persona de área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Nota al médico: No tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático.

En caso de emergencia llamar a:
SAMU: 106
RAINBOW AGROSCIENCES SAC: (511) 7139960

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los organismos acuáticos.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.
No permitir animales en el área tratada.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos y restos de aplicación.
- Respetar una banda de no aplicación, hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Shaolin®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

Composición:

Cyprodinil 375 g/Kg
Fludioxonil 250 g/Kg
Aditivos c.s.p 1 Kg

Registro PQUA N° 1674 - SENASA

Titular del Registro:
RAINBOW AGROSCIENCES SAC
Av. El Polo N°401 Oficina 610 Santiago de Surco.
Formulador:
Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd.
Binhai Economic Development Area, Weifang Shandong 262737, China.

Importado y Distribuido por:

avgust crop protection

Contenido Neto: 25 kg
N° de lote:
Fecha de Producción:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

SHAOLIN es un fungicida específico para combatir el moho gris (Botrytis cinerea); sistémico y de contacto, con poder preventivo y curativo, resultante de la acción combinada de dos sustancias activas complementarias.
SHAOLIN puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca (mochila), equipos estacionarios o accionados por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados. Para la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad de su capacidad, hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua en un balde o envase, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque de aplicación y complete el volumen de agua a utilizar.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS	P.C. (Días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	Kg/Ha		
Pimiento	Moho gris	Botrytis cinerea	0.8 - 1.0	7(1) 7(2)	0.2 (1) 0.05 (2)
Vid	Moho gris	Botrytis cinerea	1.0	7(1) 7(2)	3.0 (1) 4.0 (2)

PC: Periodo de carencia
1.Cyprodinil
2.Fludioxonil
L M R : Límite Máximo de Residuos (ppm:partes por millón)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar SHAOLIN dirigido al follaje del cultivo, cuando este se encuentre en estado de floración, previa evaluación de la enfermedad en el cultivo y cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la misma.
- Se recomienda realizar 1 aplicación por campaña como máximo.
- Es importante rotar con insecticidas de otros grupos químicos dentro de un programa de manejo integrado de plagas.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

SHAOLIN es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común.

FITOTOXICIDAD

SHAOLIN no es fitotóxico a las dosis y cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

