

LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conserve el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Piretroide
- En caso de intoxicación brindar asistencia médica y muestre la etiqueta.
 - En caso de ingestión, no administrar nada por la boca a una persona inconsciente. Si el paciente está consciente, lavar la boca con agua. Inducir al vómito bajo asistencia de un médico.
 - En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si el enrojecimiento, picor o sensación de quemazón continua, consulte al médico.
 - En caso de inhalación, llevar al intoxicado o persona afectada a un lugar ventilado. si no respira, aplicar la respiración artificial (boca a boca). Si la respiración es muy dificultosa administrar oxígeno.
 - Consulte con un médico.

Nota: No tiene antidoto específico. Tratamiento sintomático.

Teléfonos de emergencia:

- CICOTOX: 0800-1-3040
- EsSalud: 0801-10200 (línea gratuita)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo .
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas y otros artrópodos benéficos. No apliquen época de floración.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para los organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CÁPSULAS EN SUSPENSIÓN - CS

Composición:

Lambda-cyhalothrin..... 250 g/L

Aditivos..... c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° xxx-SENASA

Titular de registro: Rainbow Agrosciences S.A.C.

FORMULADO POR:

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO. LTD
6th Floor, Gaoxinjishushuangye Centre Shunhua Road 750#, Jinan
Shandong-China 250101
Tel: 86-531-88875222
Fax: 86-531-88875232

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

RAINBOW AGROSCIENCE S.A.C
Av. El Polo 401, oficina 610. Santiago de Surco.
Lima, Perú



Contenido Neto: 1 L

Lote N°

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Lastinger es un insecticida de contacto y acción estomacal. Actúa sobre un gran número de insectos, en diversos cultivos. Tiene un buen poder residual sobre insectos. Es estable a la luz solar y a las lluvias.

Lastinger puede ser aplicado con pulverizadores manuales o a motor.

Preparación: Llenar con agua el tanque del equipo de aplicación hasta la mitad del volumen necesario, agregar la cantidad de Lastinger a utilizar y completar con agua. Previo a la aplicación, calibrar el equipo.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS:

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	mL/ cil 200L		
Espárrago	Gusano Cogollero	Spodoptera frugiperda	250 - 350	3	0.02

PC: Periodo de Carenia

LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Lastinger debe aplicarse en los primeros estadios de desarrollo de la plaga. Utilizar la menor dosis cuando se observen los primeros síntomas de infestación de la plaga y si las condiciones ambientales son más favorables para su desarrollo aplicar la dosis mayor.

Aplicar máximo una vez por campaña.

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas durante 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de productos, evitar productos ácidos o alcalinos fuertes.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a las dosis y cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

