SIZE: 16.0 x 21.0 cm 13/02/2020

ASOMBROSO-AG® Bt

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN

Emamectin benzoate	8 g/kg
Bacillus thuringiensis var. kurstaki (32000 UI/mg)	64 g/kg
Aditivos	csp 1 kg

Registro PQUA Nº 1693 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO: GÓMEZ CARDONA ESDRAS ANTONIO

Car. Paita-Sullana Km. 3 Mz. B Lote 14B Z.I. Zona Especial de Desarrollo Piura - Paita - Paita, Perú . Teléfono: +51 (01) 2663828, +51 944696937 . info@agrynova.com, www.agrynova.com

FORMULADOR:

SHANGHAI AGRYNOVA CO., LTD.

Room 2105, QD 3102 Trend Centre 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong, China Teléfono: 00852-29738324 . info@shanghaiagrynova.com

IMPORTADOR:

NOVAGRO-AG S.A.C.

Car. Paita-Sullana Km. 3 Mz. B Lote 13 Z.I. Zona Especial de Desarrollo Piura - Paita - Paita, Perú . Teléfono: +51 (044) 273330 . ventas@novagro-ag.com, www.novagro-ag.com

DISTRIBUIDOR:

NOVAGRO-AG S.A.C.

Car. Paita-Sullana Km. 3 Mz. B Lote 13 Z.I. Zona Especial de Desarrollo Piura - Paita - Paita, Perú . Teléfono: +51 (044) 273330 . ventas@novagro-ag.com, www.novagro-ag.com

Fecha de Formulación : N° de Lote :

Contenido Neto : 1 Kg Fecha de Vencimiento :

NovAgro-AG

Valor e innovación al servicio del agricultor

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- -Este producto es dañino, no ingerir.
- -Peligroso si es inhalado, evite respirar la aspersión.
- -Causa irritación moderada a los oios
- -No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
 -Utilizar equipo de protección durante el manipuleo, mezcla, aplicación y
- para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- -Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- -Almacenar el producto en ambientes secos, frescos y bien ventilados.
- -No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas bebidas ni forrajes.
- -Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- -Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua potable.
- -Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- -Grupo químico: Avermectinas + derivado de microorganismo.
- -En caso de intoxicación; llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- -En caso de inhalación: Retire a la persona del área contaminada hacia una zona de aire fresco. conseguir atención médica de inmediato.
- -En caso de ingestión: Buscar ayuda médica inmediata y mostrar la etiqueta. No inducir al vómito.
- -En caso de contacto con los ojos: Lavarlos con abundante aqua fresca. por lo menos durante 15 minutos. -En caso de contacto con la piel: Quitar la ropa y calzado contaminado.
- Bañarse con abundante agua y jabón.
- -Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático.
- -En caso de emergencia llamar a:

CICOTOX: 0800-1-3040 (Atención 24 horas) o ESSALUD EN LINEA: 411-8000 (opción 4) CISPROQUIM: 080-050-847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

-Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL

- -Peligroso para abejas y otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- -No aplicar en presencia de polinizadores.
- -No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños
- -Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el
- -Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas. -Peligroso para los organismos acuáticos.
- -No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases
- -No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- -Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 m. -Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre, no
- permitir animales en el área tratada. -El aplicador debe de emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- -En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

ASOMBROSO-AG® Bt es un insecticida que actúa por contacto e ingestión con actividad translaminar , origina parálisis y daño a nivel intestinal del insecto plaga causandole la muerte por inanición.

Preparación de la mezcla:

- -En 3 a 5 litros de agua diluir la dosis requerida de coadyuvante.
- -En la premezcla, diluir la dosis indicada de ASOMBROSO-AG® Bt y
- -Llevar la mezcla, hasta el volumen final de aplicación requerido.
- Es recomendable usarse todo el producto premezclado antes de las 5 horas siguientes

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plagas		Dosis			
	Nombre común	Nombre científico	Kg/Ha	Kg/200L	PC	LMR
Alcachofa	Gusano ejército	Spodoptera frugiperda	0.32 - 0.83	0.25 - 0.30	10	0.01
Espárrago	Gusano ejército	Spodoptera frugiperda	0.74 - 1.23	0.20 - 0.30	7	0.01
	Gusano picador de la hoja	Elasmopalpus lignosellus	0.30 - 0.50	0.20 - 0.25	7	0.01
Palto	Bicho del cesto	Oiketicus kirbyi	1.25 - 1.50	0.25	3	0.01
	Gusano medidor	Sabulodes aegrotata	1.25 - 2.00	0.25	3	0.01
Pimiento	Gusano perforador	Heliothis virescens	0.38 - 0.50	0.25	3	0.02
Vid	Gusano de la vid	Pholus ampelophaga	0.50 - 1.13	0.25	7	0.05
Arándano	Gusano perforador grande de la bellota	Heliothis virescens	0.30 - 0.38	0.20 - 0.25	7	0.01
Maíz	Gusano cogollero	Spodoptera frugiperda	0.31	0.25	7	0.01
Granada	Gusano perforador grande de la bellota	Heliothis virescens	0.6 - 0.75	0.20 - 0.25	1	0.01

PC: Periodo de carencia en días

LMR: Límite Máximo de Residuos en ppm.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Para el cultivo de espárrago, realizar dos aplicaciones por campaña como máximo y al inicio de las infestaciones. Se recomienda iniciar la aplicación cuando las infestaciones sean leves a moderadas.

PERIODO DE REINGRESO:

12 horas después de aplicar el producto **ASOMBROSO-AG® Bt.**

COMPATIBILIDAD: ASOMBROSO-AG® Bt no se debe mezclar con productos alcalinos (productos con contenido de calcio) ni con aguas duras o con pH

FITOTOXICIDAD:

No se observan efectos de fitotoxicidad si se usa de acuerdo a las indicaciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las indicaciones e instrucciones dadas.





























