

Medidas Sobre: 23.5 cm x 16cm
AGOSTO 2016
ML

TIRA

PANTONE 293 C

PANTONE 300 C

PANTONE 303 C

corsario

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE – WP

Composición:

Metalaxil..... 125.0 g/kg
Fosetil Aluminio.....375.0 g/kg
Aditivos..... c.s.p. 1 Kg

Reg. PQUA N° XXX - SENASA

Titular del registro:

MONTANA S.A.

Formulado por:

OASIS AGROSCIENCE LIMKTED

12/F, Lucky Building 39.

Wellington street Central HK. China

Importado y Distribuido por:

MONTANA S.A.

Av. Javier Prado este N° 6210, Ofi. 401

La Molina, Lima - Perú

Teléfono: (511) 4193000

E-mail: info@corpmontana.com

Contenido Neto: 250 g.

Lote N°:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

 **MONTANA**

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

**LEA ESTA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
 “MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Evitar el contacto con la piel y la ropa.
- El producto es moderadamente irritante a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar el producto en ambientes secos, frescos y bien ventilados.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua potable.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Metalaxyl (Fenilamidas), Fosetyl-Aluminio (Organofosfonatos).
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión: buscar atención médica de inmediato y mostrar el envase o etiqueta. NO INDUCIR AL VÓMITO. Dar de beber agua al paciente si este es capaz de ingerirla.
- En caso del contacto con los ojos: lávelos inmediatamente con abundante agua limpia o una solución salina, y por debajo de los párpados también, durante 15 minutos como mínimo. Obtenga atención médica de inmediato.

- En caso del contacto con la piel: quitar la ropa contaminada inmediatamente. Lavar la piel contaminada con abundante agua. Si la irritación de la piel persiste, llamar a un médico. Lavar la ropa contaminada antes de reusarla.
- En caso de inhalación: trasladar al afectado a un lugar fresco. Mantener al paciente abrigado y en reposo. Llevar al paciente al médico si fuera necesario.
- **Nota al médico:** No tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CORSARIO es un fungicida sistémico; de acción preventiva y curativa, actúa inhibiendo el crecimiento del micelio y la germinación de las esporas de *Phytophthora infestans*.

CORSARIO puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca (mochila), equipos estacionarios o accionados por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados. Para la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad o ¾ partes de su capacidad, hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua en un balde o envase aparte, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque de aplicación y complete el volumen de agua a utilizar.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

MONTANA: 419-3000
 ESSALUD: 117 o 0801-10350
 CICOTOX: 0-800-1-3040

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS (Kg/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Papa	Rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	0.75 - 1.0	21	Metalaxil: 0.05 Fosetil-Al: 30

PC: Periodo de Carencia
 LMR: Límite Máximo de Residuos

