

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO • No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. • Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. • No reenvasar o depositar el contenido en otros envases. • No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. • Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. • Utilice ropa protectora durante el manipuleo, la aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 12 horas. • Después de usar el producto cámbiense, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. • El producto es ligeramente irritante para los ojos, la piel o el aparato respiratorio. • El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel e inhalación.

PRIMEROS AUXILIOS • **Grupo Químico: Triazoles** • En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta. • En caso de ingestión, no inducir al vómito ni dar nada por la boca si el paciente se encuentra inconsciente. • En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca. • En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón. • El tratamiento médico es sintomático. • No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente. • En caso de emergencia llamar a:

ARIS INDUSTRIAL S.A.: (01) 336-5428
 CISPROQUIM: 0800-50847 CETOX: 0800-71911 ESSALUD: 411-8000 ANEXO 4

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

• Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. • Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. • Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

• Peligroso para organismos acuáticos. • Peligroso para las abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración. • No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. • No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. • Respetar una banda de no aplicación para cuerpos de agua de al menos 5 metros. • Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. • El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables. • En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

EMULSIÓN, ACEITE EN AGUA - EW

COMPOSICIÓN:

Tebuconazole 250 g/L
 Aditivos c.s.p. 1 L

Registro PQUA N° 287 - SENASA
 Titular de Registro: ARIS INDUSTRIAL S.A.



IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: ARIS INDUSTRIAL S.A.
 Av. Industrial 491, Lima - Perú. Telf.: (01) 336 5428

FORMULADO POR: NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO. LTD.
 Xiepu Town, Zhenhai District, Ningbo; Zhejiang Province, China
 Oficina Central: 21 Jiangxia STR., 315000 Ningbo, China

Contenido Neto: 250 ml

Lote N°:
 Fecha de Formulación:
 Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
 CUIDADO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PODIUM 250 EW es un fungicida sistémico del grupo de los triazoles con acción protectora, curativa y erradicante. Rápidamente absorbido por las partes vegetativas de la planta. Su modo de acción es inhibir la biosíntesis de los ergosteroles, dando lugar al crecimiento anormal y posterior muerte del hongo. Las aplicaciones deberán realizarse en horas tempranas del día, evitando la mayor radiación solar o fuertes vientos o presencia de precipitación. Para su aplicación diluir la dosis correcta de **PODIUM 250 EW** en agua. Agite durante 2-3 minutos, añada el resto del agua manteniendo agitación constante. Antes de cualquier pulverización agitar completamente la suspensión del producto tan pronto como es preparado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	ml/ha	L/200 L		
Espárrago	Roya	<i>Puccinia asparagi</i>	300 - 500	0.1 - 0.17*	14 - 21	0.05
Vid	Oidiosis	<i>Erysiphe necator</i>	-	0.06	14	2
Alcachofa	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	500**	-	7	0.5
Pimiento	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	500	-	3	0.5
Mandarina	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	-	0.2	13	5

* Considerando un gasto de agua de 3 cilindros/ha ** El gasto de agua recomendado es de 700 L/ha
 P.C.: Período de carencia en días L.M.R.: Límite máximo de residuos expresados en ppm

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Para el cultivo de espárrago se recomiendan 2 aplicaciones por campaña. Aplicar a la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad. Para el cultivo de vid se recomienda una aplicación por campaña por año. Realizar aplicación foliar según las condiciones del cultivo y/o cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad. Para el cultivo de alcachofa se recomienda una aplicación por campaña. Realizar la aplicación foliar cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

PERÍODO DE REINGRESO: No entre a las áreas tratadas durante 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: **PODIUM 250 EW** es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a las dosis y usos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico - químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

