

# FAITER<sup>®</sup> 75 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**GRANULOS DISPERSABLES (WG)**

**COMPOSICIÓN:**

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Tebuconazole .....    | 500 g/Kg    |
| Trifloxystrobin ..... | 250 g/Kg    |
| Aditivos .....        | c.s.p. 1 Kg |

**Reg. PQUA N° - SENASA**

**TITULAR DEL REGISTRO: CAPEAGRO S.A.C.**



**FORMULADO POR:**  
**AGROMOL BIOTECH COMPANY LIMITED**  
East side, middle section of Binhe Road,  
Shanxian County Chemical Industry Park, Xieji  
Town, Shanxian County, Heze City, Shandong  
Province, China

**Importador y  
Distribuidor:**

**CAPEAGRO S.A.C.**  
Calle E. Diez Canseco 333. Of. "E"  
Miraflores - Lima  
[www.capeagro.com](http://www.capeagro.com)

Contenido Neto: **0.5 kg**  
N° de Lote:  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

## LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

### MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien cerrado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice aplicación siguiendo la dirección del viento.

#### PRIMEROS AUXILIOS:

##### Grupo Químico: Triazole + Estrobilurin

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece de convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- ANTIDOTO: Este producto no tiene antidoto específico. El tratamiento es sintomático.

#### TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

ESSALUD: 0801-10200 (línea gratuita)  
CICOTOX: 0800-13040 (línea gratuita)

#### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrante del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

#### CONDICIONES DE USO Y MANEJO

- FAITER 75 WG es un fungicida sistémico que combina dos ingredientes activos de diferente modo de acción, el tebuconazole que actúa interfiriendo la síntesis de ergosterol y el trifloxystrobin que actúa inhibiendo la respiración celular de los hongos. De acuerdo al modo de acción de ambos componentes, el producto se puede utilizar de forma preventiva, curativa y erradicante.

#### - Modo de Preparación:

Vierta la dosis del producto en la mitad de la cantidad de agua a aplicar, mezcle el producto agitando y luego agregue el resto del agua hasta completar la cantidad requerida.

#### FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN:

Aplicar FAITER 75 WG máximo 2 aplicaciones por campaña y 2 campañas/año, en presencia de la plaga luego de haber efectuado una evaluación del campo y considerando el umbral económico del cultivo.

#### PERIODO DE REINGRESO:

Se puede ingresar al área tratada después de 24 horas.

#### COMPATIBILIDAD:

El producto es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios comúnmente usados.

#### FITOTOXICIDAD:

En los diferentes ensayos de campo realizados con la sustancia activa no se han detectado respuestas fitotóxicas a las dosis recomendadas de aplicación. Por lo tanto no se debe esperar reacciones fitotóxicas derivadas de la aplicación del producto.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

### “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

| CULTIVO  | PLAGA      |                           | DOSIS<br>(kg/ha) | PC*<br>(días) | LMR**<br>(ppm)     |
|----------|------------|---------------------------|------------------|---------------|--------------------|
|          | N. común   | N. Científico             |                  |               |                    |
| Vid      | “Oidiosis” | <i>Erisiphe necator</i>   | 0.300-0.375      | 35            | 6.0 (a)<br>3.0 (b) |
| Pimiento | “Oidium”   | <i>Leveillula taurica</i> | 0.25             | 7             | 1.0 (a)<br>0.3 (b) |

\*P.C.: Periodo de carencia (días) \*\*L.M.R.: Límite máximo de residuos (a) Tebuconazole (b) Trifloxystrobin

