

“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

- PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**
- Este producto es de cuidado, no ingerir.
 - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
 - Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
 - Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
 - Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
 - Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado.
 - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas ni forraje.
 - Ningún envase que haya contenido plaguicidas, debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
 - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

- PRIMEROS AUXILIOS**
Grupo Químico: Neonicotinoide
- Acudir al centro hospitalario inmediatamente y mostrar la etiqueta.
 - En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua limpia, durante por lo menos 15 minutos, con lo párpados abiertos durante el lavado.
 - En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón, incluyendo el cabello y debajo de las uñas.
 - En caso de ingestión; no inducir al vómito, no dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
 - En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Controle la respiración y si fuera necesario brindar respiración artificial.
 - Este producto no tiene antídoto específico.
 - El tratamiento es sintomático y de soporte.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
ESSALUD: 0801-10200 (línea gratuita)
CICOTOX: 0800-13040 (línea gratuita)
Rainbow Agrosociences S.A.C: 713-9960

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para las abejas.
- No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuático.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar el uso del producto en suelos arenosos o en zonas con napas freáticas superficiales.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

KEYROLE 50 WG

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

INSECTICIDA AGRICOLA

GRANULOS DISPERSABLES (WG)

COMPOSICIÓN QUÍMICA:
Clothianidin 500 g/Kg
Aditivosc.s.p. 1 Kg

Reg No:

Tiitular del Registro:
RAINBOW AGROSOCIENCES SAC
Av. El Polo N° 401 Oficina 610
Santiago de Surco, Lima

Importado y Distribuido por:

Fabricado Por:

SHANDONG WEIFANG
RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.
Binhai Economic
Development Area, Weifang, Shandong 262737, China

Lote N°:
F. de Form:
F. de Venc:

® Marca registrada **Contenido Neto: 1 Kg**

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

KEYROLE 50 WG es un insecticida sistémico del grupo Neonicotinoide, que controla mosquilla de los brotes *Prodiplosis longifila* en el cultivo de la Tomate. actúan sobre el sistema nervioso central de los insectos.

MODO DE APLICACIÓN:

Para garantizar uniformidad de la mezcla, coloque la cantidad de **KEYROLE 50 WG** a aplicar en un recipiente con agua hasta la mitad y agite suficientemente, complete luego el volumen de agua requerido mientras continúa agitando la mezcla mecánica, hidráulica o manualmente. Utilizar siempre equipos de aplicación calibrados correctamente y asegurarse que la aplicación se realice uniformemente. Antes de proceder a llenar los equipos es importante asegurarse de que estos estén bien limpios, sin residuos de otros plaguicidas y en buen estado para evitar posibles fugas de producto.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	MALEZA		DOSIS	P.C.	LMR
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE TÉCNICO	Kg/ha	(días)	(ppm)
TOMATE	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.4 - 0.5*	14	0.05

*Usar la menor dosis cuando se presente baja presencia de la plaga y la dosis alta cuando se presenten mayores valores de infestación.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Realizar dos aplicaciones de **KEYROLE 50 WG** por campaña. La primera aplicación se debe realizar entre los 30 y 40 días del transplante, dependiendo de la variedad de tomate, población de la plaga y el clima reinante. La segunda aplicación se realizará a los diez días posteriores.

PERIODO DE REINGRESO: 24 Horas

COMPATIBILIDAD

KEYROLE 50 WG es compatible insecticidas y fungicidas de otros grupos químicos.

FITOTOXICIDAD:

KEYROLE 50 WG No causa fitotoxicidad si se sigue las recomendaciones mostradas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

