

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Este producto es de cuidado. No ingerir.

Causa irritación en la piel.

Causa daño temporal a los ojos.

El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.

Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.

Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

Almacenar el producto bajo techo en ambientes frescos, secos y ventilados.

No almacenarse ni transportarse conjuntamente con alimentos, bebidas, forrajes, medicinas.

No debe comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: Pyrazole + Triazole

En caso de intoxicación, brindar asistencia médica, de ser necesario trasladar al paciente a un centro médico y mostrar la etiqueta.

En caso de ingestión trasladar inmediatamente al paciente a un centro médico. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente.

En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados. Retirar los lentes de contacto si los tuviera.

En caso de contacto con la piel, lavar con agua abundante y jabón. Quitar la ropa contaminada.

En caso de inhalación, trasladar al paciente al aire libre de ser necesario aplicar respiración artificial. Trasladar al paciente a un centro médico.

Nota: No existe antídoto específico, el tratamiento es sintomático y de soporte.

Telefonos de emergencia:

CICOTOX: 08001-30-40

CISPROQUIM: 0800-50847

BAYER S.A. (01) 211-3800

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES

VACÍOS:

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

Peligroso para organismos acuáticos.

No contaminar ríos, arroyos o estanques con los desechos o envases vacíos.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.

Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



Zantara[®] 216 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Concentrado emulsionable (EC)

Composición:

Bixafen,50 g/l

Tebuconazole,166 g/l

Aditivos, csp 1 L

Reg. PQUA N°

Titular del Registro:

Bayer S.A.

Paseo de la República 3074

Piso 10. San Isidro.

Formulado por:

Bayer CropScience AG

Industriepark Höchst

65926 Frankfurt

Alemania

Importado y distribuido por:

Bayer S.A.

Paseo de la República 3074

San Isidro. Lima-Perú

Telef. 211-3800

NO CORROSIVO NO EXPLOSIVO
NO INFLAMABLE

Contenido
Neto: 1 litro

Lote N°

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

© = Marca Registrada del grupo Bayer

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Zantara 216 EC es un fungicida foliar formado por dos ingredientes activos complementarios Bixafen y Tebuconazole.

Bixafen actúa bloqueando una enzima que tiene un papel importante en la cadena respiratoria del patógeno, lo cual reduce la producción de energía de manera que el crecimiento del patógeno se inhibe. Por otro lado Tebuconazole actúa inhibiendo la biosíntesis del ergosterol y otros procesos enzimáticos de los hongos.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS l/ha	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico			
Arroz	Rhizoctonia	<i>Rhizoctonia solani</i>	0.75	N.D	1.5 * 0.01 **

* Tebuconazole ** Bixafen

PC= Período de carencia (días)

LMR= Límite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón)

N.D= No determinado

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda aplicar Zantara 216 EC (i.e Bixafen +Tebuconazole) hasta dos veces por campaña como máximo, considerando una frecuencia entre aplicaciones de 10 a 15 días.

El momento de aplicación debe ser previa evaluación de la presencia de la enfermedad.

PERIODO DE REINGRESO:

12 horas

COMPATIBILIDAD:

Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad antes de realizar la mezcla.

FITOTOXICIDAD:

Zantara 216 EC posee buena fitocompatibilidad con los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

