ZABLE® 5G

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

Granulado (GR)

COMPOSICIÓN:

Butachlor..... 50 g/kg
Aditivos..... 950 g/kg

Reg. PQUA Nº 1675 - SENASA

Titular de Registro:

Comercial Andina Industrial S.A.C.

Av. Benavides 1579. 7mo piso. Of. 702. Edificio Del Park II. Lima 18 - Perú
Telf.: (01) 253-6444 / atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Formulado por:

OASIS AGROSCIENCE LIMITED
Room 1510, Nro. 500,Xinjiang Road, Shangai, China
Telf.: + 86 – 21- 63807578

Distribuidor:

GRUPO ANDEX S.A.C.

Av. Benavides 1579 Oficina 703 Edificio DEL PARK II / Miraflores - Lima - Perú
Telf.: (01) 253-6444 / atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Lote Nº:
F. de Form:
F. de Venc:
® Marca registrada

Contenido Neto: 200kg

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO **NO EXPLOSIVO**

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este productos es dañino, no ingerir.
- Evite respirar (polvo o aspersión).
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Es tóxico por ingestión.
- El producto es sensibilizante a la piel, puede causar alergias. Usar indumentaria de protección.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos secos y ventilados.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Ninguno envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: CLOROACETAMIDA
- En caso de ingestión del producto o de presentarse síntomas de intoxicación, no provocar el vómito, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y, si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- ANTÍDOTO: Sulfato de atropina vía intramuscular o intravenosa.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CICOTOX: 0-800-1-3040 / CAISAC (01) 253-6444

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya este envase y depósitelo en lugares destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi-acuáticas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas de napa freáticas superficiales o en suelo altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

ZABLE 5G es un herbicida pre-emergente selectivo al cultivo de arroz, para ser usado en el control de malezas gramineas y algunas de hoja ancha.

SISTEMA DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Siembra directa: aplique el herbicida después de la siembra del arroz. Es recomendable tener pozas bien preparadas y con lámina de agua permanente. Aplicar el producto sobre la lamina de agua, retener el agua y desaguar en no menos de una semana. Luego mantener una lamina de agua con el fin de tener activo el producto en las pozas.

Arroz de transplante: Después del transplante aplique preferiblemente con una pequeña lamina de agua, o en seco, siempre y cuando se tenga humedad en el suelo. Esta debe hacerse la primera semana después del transplante antes que emerjan las malezas, después rellenar las pozas y mantenerla sin desaguar por lo menos de 5 a 7 días. Aplicaciones con maleza muy crecidas puede dificultar el control, por lo que es recomendable hacer la aplicación siempre antes que emerjan las malezas.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Una sola aplicación después de la siembra con el riego de germinación (en siembra directa) después del transplante (en siembra indirecta).
Número máximo de aplicaciones por campaña: 1.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al campo sin equipo de protección, 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

ZABLE 5G, por su forma de aplicación no debe mezclarse con ningún plaguicida, sin embargo es compatible con la mayoría de herbicidas pre emergentes que hay en el mercado, para ampliar su espacio de acción.

FITOTOXICIDAD

No se ha observado fitotoxicidad del producto para los cultivos y dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS	P.C. (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/ha		
ARROZ	"Moco de pavo" "Cebadilla" "Oreja de ratón"	*Echinochloa crus-galli* *Echinochloa colona* *Commelina diffusa*	60	60	0.1

LMR: Límite Máximo de Residuos **PC:** Periodo de Carencia