

Manzate® 200 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Polvo Mojable (WP)

Composición Química:

Mancozeb800 g/kg

Aditivosc.s.p. 1 kg

Reg. PQUA No SENASA



Titular del Registro
UNITED PHOSPHORUS PERU S.A.C.
Calle Cahuide 262. Dpto 302
Surco, Lima – Perú
Telf.: +51 1 255 7777

Fabricado y Formulado por:



Uniphos Colombia Plant Limited
Vía 40 No. 85-85
PBX.: (575) 3616200
Fax: (575) 3616210
Barranquilla – Colombia

Importado y Distribuido por:

FARMAGRO S.A.
Av. Alfredo Mendiola 6068, Los Olivos – Lima, PERÚ.
Teléfono: 6141500 Fax. 6141517
R.U.C. N° 20307150981



CONTENIDO NETO: 25 Kg

No. de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

“MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION

- Este producto es de cuidado, no ingerir
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar (polvo, vapor o aspersión).
- Causa daño temporal a los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Dithiocarbamate
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito ni administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece de convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, levantar los párpados y lavar los ojos con abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos. Retirar lentes de contacto si los hubiera y continuar enjuagándolos.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar inmediatamente la piel con abundante agua y jabón durante 15 a 20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado, mantenerlo en reposo y si fuera necesario brindar respiración artificial.

Nota al médico:

- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

- CICOTOX 0800-13040 - ESSALUD: 0801-10200 (línea gratuita)
- CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para abejas.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarla en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Manzate® 200 WP es un fungicida agrícola ditiocarbamato preventivo, recomendado para el control de diversas enfermedades detalladas en el cuadro de uso específico.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Se recomienda usar Manzate® 200 WP según las dosis detalladas en el cuadro de usos específicos. Llénese el tanque de ¼ a la mitad de agua. Empiece a agitar (agitación mecánica o hidráulica) añada la cantidad requerida de Manzate® 200 WP. Llénese el tanque de agua. Continúe agitando la mezcla constantemente durante la aspersión. MANZATE 200 WP (Mancozeb 800 g/kg WP), se aplica en dosis de 0.8 - 1.0 kg/ha (400 litros de agua). Se puede aplicar con cualquier equipo terrestre, pulverizadora manual, bomba de mochila de espalda y con mochila de espalda a motor.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

El número de aplicaciones así como el momento de la aplicación depende de la incidencia de la enfermedad y de las condiciones climáticas que imperen. Se recomienda aplicar MANZATE 200 WP (Mancozeb 800 g/kg WP), como fungicida protectante o cuando se noten los primeros síntomas de la enfermedad. De 1- 2 aplicaciones en intervalos que van de 5 - 10 días son suficientes para lograr un buen control de la enfermedad.

PERÍODO DE REINGRESO:

Ingreso al área tratada 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

Se puede aplicar en mezcla con los principales plaguicidas, sin embargo se recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes de las aplicaciones.

FITOTOXICIDAD:

Tiene buena fitocompatibilidad con los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.”

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USO:

CULTIVOS	NOMBRE DE LA PLAGA		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	N. Común	N. Técnico	Kg/200L	Kg/Ha		
Zapallo	Mildiu vellosa	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	0.4 - 0.5	---	7	0.2
Pepino	Mildiu vellosa	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	0.4 - 0.5	---	7	2
Melón	Mildiu vellosa	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	0.4 - 0.5	---	7	0.5
Sandía	Mildiu vellosa	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	0.4 - 0.5	---	7	1
Cebolla	Mildiu vellosa	<i>Peronospora destructor</i>	0.4 - 0.5	---	7	0.5
Lechuga	Mildiu vellosa	<i>Bremia lactucae</i>	0.4 - 0.5	---	7	10
Pimentón Ají	Azul o hielo Antracnosis Antracnosis	<i>Phytophthora capsici</i> <i>Gloeosporium spp.</i> <i>Colletotrichum capsici</i>	0.35-0.5	---	14	1
Papa	Hielo (rancha) Tizón temprano	<i>Phytophthora infestans</i> <i>Alternaria solani</i>	0.5-1.0	---	7	0.2
Tomate	Hielo (rancha) Septoriosis Tizón temprano Mancha foliar gris del tomate Mancha amarilla	<i>Phytophthora infestans</i> <i>Septoria lycopersici</i> <i>Alternaria solani</i> <i>Stemphylium solani</i> <i>Colletotricum coccodes</i>	0.4 - 0.5 0.35-0.5 0.4 - 0.5 0.35-0.5 0.35-0.5	---	14	4
Manzana	Sarna Podredumbre amarga Antracnosis Mancha del fruto Mancha Foliar	<i>Venturia inaequalis</i> <i>Botryosphaeria obtusa</i> <i>Glomerella cingulata</i> <i>Mycosphaerella pomi</i> <i>Botryosphaeria sp.</i>	0.35-0.5	---	14	7
Papaya	Antracnosis	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	0.35-0.5	---	14	5
Vid	Podredumbre negra Antracnosis o roña en hojas	<i>Guignardia bidwelli</i> <i>Elsinoe ampelina</i>	0.35-0.5	---	7	5
Algodón	Mancha de la hoja	<i>Alternaria sp.</i>	---	2.0	7	0.5
Cebada	Mancha de la hoja Escaldado de la hoja Roya del tallo Roya de la hoja Roya amarilla	<i>Helminthosporium turcicum</i> <i>Rhynchosporium secalis</i> <i>Puccinia graminis</i> <i>Puccinia hordei</i> <i>Puccinia striiformis</i>	---	2.5-3.0	7	1
Maíz	Mancha de la hoja Antracnosis Cercosporiosis	<i>Helminthosporium sp.</i> <i>Colletotrichum sp.</i> <i>Cercospora sp.</i>	---	2.5-3.0	7	0.1
Sorgo						1
Trigo	Roya	<i>Puccinia spp.</i>	---	2.5-3.0	26	1
Avena						5
Pastos						25
Arroz	Helminthosporium Mancha alargada Pyricularia	<i>Helminthosporium oryzae</i> <i>Sphaerulina oryzina</i> <i>Pyricularia oryzae</i>	---	2.5-3.0 2.5-3.0 3.5-4.5	10	N.D.

TRATAMIENTO DE SEMILLA

Arroz	Mancha de la hoja Chupadera	<i>Alternaria sp.</i> <i>Fusarium sp.</i>	2-3 gr/Kg de semilla	10	N.D.
Papa	Pudrición	<i>Fusarium sp.</i>	0.72 Kg/200 L Inmersión rápida	7	0.2

LMR: Límite Máximo de Residuos

PC: Periodo de Carencia

ND: No Disponible.

