

**“LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA
INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR
EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DE
ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. Evitar el contacto con los ojos, piel y ropa. En caso de intoxicación accidental llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y la hoja informativa adjunta.

En caso de emergencia llamar gratis a:
CICOTOX: 0800-13040.
ESSALUD: 0801-10200.



Contenido neto : 500 ml
Lote N° :
Fecha de formulación :
Fecha de vencimiento :

CIRCON®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición:

Fipronil..... 190 g/L
Thiamethoxam..... 350 g/L
Aditivosc.s.p. 1L

Reg. PQUA N° - SENASA

Titular del registro: HORTUS S.A.

Formulado por:



GLEBA S.A.
Avenida 520 y Ruta Prov. 36,
Melchor Romero - La Plata
Buenos - Aires
Tel (Fax) (0221) 4913062 / 6093
www.gleba.com.ar

Importado y distribuido por:



Calle Sucre 270 Ate. Lima, Perú.
Telf.: 717-9040 / 717-9041 Fax: 718-8684
R.U.C. 20101637221
RU N° 141097

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CIRCON es un insecticida cuyos ingredientes en su efecto combinado proporciona una protección amplia contra las plagas. Fipronil del grupo de los Fenilpyrazoles con acción antagonista del canal de sodio y Thiamethoxam, es un neonicotinoide sistémico de alta residualidad, que controla insectos succionadores.

CIRCON se puede aplicar con cualquier equipo de pulverización accionado manual o mecánicamente. La boquilla a usar debe ser cónica vacía, dar buena cobertura.

Antes de preparar, asegúrese que el agitador del tanque esté operativo, el mismo que debe mantenerse en funcionamiento durante todo el periodo de aplicación. Regule el agua a un pH entre 5 - 6. Vierta el agua hasta la mitad de la capacidad del tanque del pulverizador; diluya el producto en un balde; luego vierta en el tanque del pulverizador con el agitador en funcionamiento. Complete con agua hasta el nivel deseado.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	P L A G A		DOSIS (L/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Papa	Gorgojo de los andes	<i>Premnotypes suturicallus</i>	0.2	20 ⁽¹⁾ 14 ⁽²⁾	0.01 ⁽¹⁾ 0.3 ⁽²⁾

PC: Periodo de carencia en días.

LMR: Límite máximo de residuo en ppm.

(1) Fipronil.

(2) Thiamethoxam.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

v20160819

