

Longitud Total 28.9 cm.

Altura Total 13.5 cm.

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, mezcla y aplicación (guantes de goma, delantal, botas de goma, gafas, careta, gorro, máscara) y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- El producto es irritante a la piel y causa irritación moderada a los ojos.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Aryloxyfenoxipropionato
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- Su ingestión accidental, produce síntomas de intoxicación como dolor de cabeza, diarrea, vómito, etc. Dar de beber uno o dos vasos con agua. El vómito sólo debe ser provocado bajo la dirección de un médico. Realizar un lavado gástrico.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- Nota al médico: No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.

TELÉF. EMERGENCIA: SAMU: 106; AGRO KLINGE S.A.: (01) 641-0000.
CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
 - Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
 - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
 - Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
 - Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
 - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
 - En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



HACHE UNO SUPER®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:

Fluazifop-p-butyl..... 175 g/L
 Aditivos..... csp 1L

Reg. N° 167-96-AG-SENASA

Titular del Registro, Importador y Distribuidor:



AgroKlinge S.A.
 Av. El Derby N° 254, Int. 306, Santiago de Surco.
 Lima - Perú. Telf: (01) 641-0000

Formulador:
Ishihara Sangyo Kaisha Ltd.
 3-15, Edobori, 1-Chome, Nishi-ku Osaka 550-0002, Japón
 Telf: 06-6444-7154

**Contenido
Neto: 1 L**

N° de Lote:
 F. de Formulación:
 F. de Vencimiento:



NO CORROSIVO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: HACHE UNO SUPER es un herbicida inhibidor de la acetil CoA carboxilasa (ACCCase), sistémico, selectivo, post-emergente. Se absorbe a través de la superficie de la hoja. Controla malezas gramíneas anuales y perennes en diversos cultivos. HACHE UNO SUPER se aplica en pulverizaciones, previa mezcla con agua. Se recomienda agregar un adherente a la mezcla para favorecer la dispersión y adherencia del herbicida. Aplicar, uniformemente con cualquier equipo de aspersión, provisto de boquilla de abanico, cuando las malezas presenten 2 a 3 hojas, en suelo húmedo. Repetir la aplicación en casos de que algunas gramíneas perennes pudieran retoñar o hubiera germinación de nuevas semillas de plantas anuales. Evitar la deriva o arrastre de la solución hacia cultivos sensibles.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	MALEZA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/ha	ml/200L		
TOMATE	"Grama china" "Grama dulce"	<i>Sorghum halepense</i> <i>Cynodon dactylon</i>	1-1.5	500-750	15	0.1
PAPA	"Grama china"	<i>Sorghum halepense</i>	1-1.5	500-750	15	0.1
CÍTRICOS, MELOCOTÓN, MANZANO, PALTO	"Gramalote"	<i>Panicum purpurascens</i>	1-1.5	500-750	N.A.	0.1 0.05 0.05 0.02
VID	"Pata de gallina"	<i>Eleusine indica</i>	1-1.5	500-750	N.A.	0.2
ALGODÓN	"Cadillo"	<i>Cenchrus echinatus</i>	1-1.5	500-750	15	0.1
CEBOLLA AJO	"Rabo de zorro"	<i>Setaria geniculata</i>	1-1.5	500-750	N.A.	0.5 0.5
FRIJOL ESPÁRRAGO	"Pega pega" "Pajilla"	<i>Setaria verticillata</i> <i>Leptochloa uninervis</i>	1-1.5	500-750	N.A. 8	5 3
ALFALFA, MARYGOLD	"Grama dulce"	<i>Cynodon dactylon</i>	1-1.5	500-750	15	N.A.
PAPRIKA ALCACHOFA	"Grama dulce" "Rabo de zorro"	<i>Cynodon dactylon</i> <i>Setaria geniculata</i>	1-1.5	500-750	45 N.A.	0.02 0.2

P.C. = Período de Carencia / L.M.R. = Límite máximo de residuos / N.A. = No aplica

NOTA: Usar la dosis menor en malezas pequeñas y la dosis mayor en malezas desarrolladas con rizomas establecidos.

VOLUMEN DE APLICACIÓN: 400 L/ha.

PERÍODO DE REINGRESO, COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD: Ver Hoja Informativa adjunta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto."



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



Longitud Literal 27 cm.

Longitud de Color 28 cm.

09 cm