

64.0 cm

**"LEA TOTALMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo. En un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación, para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimento o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Aryloxyphenoxypropionate
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al Centro Médico y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión, no administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- **NOTA AL MÉDICO:** No tiene antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático y de soporte.
- En caso de Emergencias llame:
CICOTOX 0500-13040 (24 horas); ESSALUD 423-7600 / 0801-10200

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades locales para este fin.



NADAL[®]

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:

Cyhalofop-butyl 180 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N°-SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:
DROKASA PERU S.A.
Jr. Mariscal La Mar N° 991 - Piso 9
Magdalena del Mar. Telf.: 501-1000



FORMULADO POR:
NANTONG JIANG CHEMICALS CO., LTD.
No. 10 of Yangze Road, Linjiang Chemical
Industry Park, Haimen, Jiangsu Province, China

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERU S.A.

Fecha de formulación:
N° de lote:
Contenido Neto: 20 Litros
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

© Marca registrada

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

NADAL es un herbicida sistémico, post emergente. Actúa inhibiendo la acetil CoA carboxilasa (ACCasa), enzima fundamental para la biosíntesis de ácidos grasos en la planta. Usado para el control de todo tipo de malezas gramíneas en el cultivo de arroz.

NADAL se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego se lleva al cilindro o mochila y se completa con agua hasta el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar con cualquier equipo de aspersión terrestre.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS Litros/ha	PC días	LMR ppm
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Arroz	Moco de pavo	<i>Echinochloa crus-galli</i>	1 - 1.5	60	0.01
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>			
	Cadillo	<i>Cenchrus echinatus</i>			
	Gramma dulce	<i>Cynodon dactylon</i>			

LMR: Límite máximo de residuos

PC: Periodo de carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar **NADAL** (i.e. Cyhalofop-butyl) una aplicación por campaña como máximo, considerando dos campañas al año. Aplicar **NADAL** en la etapa vegetativa del cultivo de arroz, cuando las malezas se encuentren en la etapa de emergencia temprana (malezas con 2 - 3 hojas).

PERIODO DE REINGRESO: No ingresar al área tratada hasta 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

NADAL se puede mezclar con chlorpyrifos y pendimethalin. No mezclar con MCPA, bentazone, benazulfuron-methyl, carfentrazone. Se recomienda realizar pruebas preliminares de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:

NADAL es selectivo para el cultivo de arroz.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



15.0 cm