

29.2 x 14.5 cm

**"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos y si el contacto fuese por la piel lávese con abundante agua limpia y jabón.

Nota al médico: Tratamiento sintomático si aparece diarrea. No se recomienda el lavado gástrico a menos que se haya ingerido grandes cantidades.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106 / CAISAC: (01) 255-2830**

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.



REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición:

Acido Alfa Naftalenacetico 0,40%
Acido 3 Indol Butirico 0,10%
Aditivos c.s.p. 1L

Reg. PBUA N° 057 - SENASA

Titular de Registro, Formulador y Distribuidor:



Av. Benavides 1579. 7mo piso. Oficina 702. Edificio Del Park II. Lima 18 - Perú
Télf.: (01) 255-2830 / atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Contenido Neto: 1L

Lote N°:
F. de Form:
F. de Venc:
® Marca registrada

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Root-Hor es un regulador de crecimiento de plantas usado para estimular la producción de nuevas raíces en hortalizas y frutales.
Se usa en frutales vía drench o a través del sistema de riego por goteo también se usa para enraizar en acodos y esquejes de árboles frutales por inmersión en una solución nutritiva de Root-Hor y en aplicaciones foliares sobre hortalizas pos emergencia y/o trasplante.

Sistema de preparación y aplicación: Para enraizamiento de acodos y esquejes, en un recipiente verter 5 ml de Root-Hor por 1 litro de agua, introducir las estacas 3 cm. del nivel de agua del recipiente, durante 5 minutos. Luego de la aparición de las primeras hojas se complementa con una segunda aplicación vía foliar. Para enraizamiento de hortalizas pos -trasplante. Verter 250 ml de Root-Hor en 200 litros de agua luego mezclar homogéneamente y aplicar foliarmente.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	Dosis de Root-Hor en la inmersión de esquejes	Dosis de Root-Hor / 200 L Agua en la aplicación foliar	Dosis de Root-Hor/ha vía drench y/o fertirriego	P.C. (días)	LMR (ppm)
Alcachofa	-	250 ml.	-	N.A.	N.A.
Arándano	-	-	4L	N.A.	N.A.
Clavel	0.5 %	-	-	N.A.	N.A.
Col	0.5 %	250 ml.	-	N.A.	N.A.
Manzano	0.5 %	250 ml.	-	N.A.	N.A.
Melocotón	0.5 %	250 ml.	-	N.A.	N.A.
Membrillo	0.5 %	250 ml.	-	N.A.	N.A.
Palto	-	-	4L	N.A.	N.A.
Páprika	-	250 ml.	-	N.A.	N.A.
Vid	-	-	4L	N.A.	N.A.
Yuca	0.5 %	250 ml.	-	N.A.	N.A.
Granado	-	-	4L	N.A.	N.A.
Mandarina	-	-	3L	N.A.	N.A.

LMR: Límite Máximo de Residuos PC: Periodo de carencia N.A.: No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda el uso del producto al inicio de cada campaña y/o en aquellos momentos en que se requiera que la planta estimule la producción de nuevas raíces.
Mandarina: Aplicar al inicio de brotación para crecimiento de raíces. Gasto de agua: 1500 L/ha

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Root-Hor® es compatible con la mayoría de plaguicidas agrícolas, excepto con los agentes oxidantes fuertes. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

Root-Hor no es fitotóxico a las dosis y usos recomendados en esta etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fine aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



PRECAUCIÓN



1.3cm

Banda verde Pantone 347 C

LOGO CAISAC
PANTONE 711 C

LOGO CAISAC
PANTONE 2945 C

FONDO ROOT HOR
PANTONE 199 C