33,50 centímetros

13,40 centímetros

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Precauciones y Advertencias de Uso y Aplicación

-Lea cuidadosamente la etiqueta y siga sus instrucciones. No comer, beber ni fumar durante la preparación y uso del producto. Este producto puede causar irritación en ojos y piel, normalmente no se requiere ropa protectora, respiradores o anteojos de seguridad, evite el contacto con piel y ropa y el ingreso a los ojos.
-No trate de limpiar el equipo de aplicación soplando directamente con la boca cualquiera de sus partes. Durante el transporte y almacenamiento, evitar roturas en los envases.
-No transportar ni almacenar junto con medicinas, alimentos, animales. Almacenar en un depósito adecuado y provisto de techo manteniéndolo bajo llave y lejos del alcance de los niños.
-Usar ropa adecuada, mascarilla, guantes, botas y anteojos protectores durante la aplicación.

-DIPEL 2X se debe conservar en su recipiente herméticamente cerrado. DIPEL 2X se puede mantener almacenado por mas de 3 años sin perder su efecto insecticida.

Primeros Auxilios

-En caso que salpique la solución concentrada en los ojos, enjúguelos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos. Lávese la piel con abundante agua y jabón. Quitarse la ropa contaminada antes de volver a usarla. Provoque el vómito en caso de ingestión y consiga ayuda médica.
-DIPEL 2X no es tóxico para el hombre y no se han detectado síntomas específicos, en caso de sufrir síntomas de intoxicación tales como mareo, vómitos, etc. llamar de inmediato al médico más cercano.
-En caso de ingestión efectuar un lavado gástrico. Después de la aplicación lavarse las manos y el resto del cuerpo con abundante agua y jabón.
-No existe antídoto específico.

Teléfonos de emergencia en caso de intoxicación
CICOTOX: 0800-1-3040

Manejo y disposición de desechos y envases vacíos

-Después de usar el contenido destruya este envase y depositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
-No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
-No mezclar con residuos municipales.

Medidas para la protección y conservación del ambiente

-No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
-No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
-En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

DiPel® 2X

AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO MICROBIANO

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Polvo Mojable (PM)

Composición:
Bacillus thuringiensis, var. *Kurstaki*;
Contiene 32,000 unidades internacionales de potencia por miligramo.....64%
Aditivos csp 100%

Reg.:PBUA N° 011-SENASA

Formulada por:
VALENT BIOSCIENCES CORPORATION
870 Technology Way
Libertyville, Illinois U.S.A.
Phone: (847 816-3700

Titular del Registro:
SMTM Perú S.A.C
Av. República de Panamá 3531,
Of. 1203 - Lima 27
T: 511-421-4811

Distribuido por:
Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
San Isidro, Lima-Perú

Contenido Neto:
Lote Nro:
Fecha de Expiración:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO CORROSIVO**

®-Marca Registrada de Valent BioSciences

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Dipel 2X es uno de los insecticidas más seguros que se utilizan hoy en día. El ingrediente activo de Dipel está constituido por esporas de la bacteria Bacillus Theringiensis y cristales tóxicos de Delta endotoxina. Ambos elementos controlan las larvas de lepidópteros cuando éstas ingieren el follaje tratado con DIPEL, la muerte puede ocurrir 40 a 72 horas posteriores al tratamiento, sin embargo las larvas dejan de alimentarse y causar daño entre 5 a 10 minutos de ingerir la dosis de DIPEL.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga		Dosis			PC* (días)	LMR** (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	gr/ha	%	gr/cu		
Algodón	Gusano medidor	*Alabama sp.*	250	0.05	100		
	Gusano cogollero	*Spodoptera sp.*	500	0.1	200		
	Gusano bellotero	*Heliothis sp.*	250	0.05	100		
Espárrago	Barrenador de brotes	*Heliothis virescens*	500	0.1	200		
Col	Gusano de la col	*Pieris sp.*	250	0.05	100		
Brócoli	Palomilla	*Plutella sp.*	250	0.05	100		
Melón	Gusano perforador	*Heliothis sp.*	250	0.05	100		
Sandía	Gusano perforador	*Diaphania sp.*	250	0.05	100		
Tomate	Falso medidor	*Trichoplusia sp.*	250	0.05	100	•	•
	Gusano del fruto	*Heliothis sp.*	500	0.1	200		
	Gusano cogollero	*Spodoptera sp.*	250	0.05	100		
Maíz	Gusanos cortadores	*Agrotis sp.* *Prodenia sp.*	20 kg cebo tóxico				
Sorgo	Gusano cogollero	*Spodoptera frugiperda*	500	0.1	200		
Alfalfa	Gusano de la alfalfa	*Epinotia aporema*	125	0.025	50		
Cítricos	Gusano perro	*Papilio sp.*	250	0.05	100		
	Gusano pegador de hojas	*Argyrotaenia sp.*	250	0.05	100		
Palma	Gusano defoliador	*Eupseudorma sp.*	250	0.05	100		

PC* = Última aplicación antes de la cosecha (días) LMR** = Límite máximo de residuos (ppm)
- = No existen restricciones en la aplicación de Dipel antes de la cosecha

Frecuencia y época de aplicación
Aplicar de acuerdo al nivel de infestación, al inicio de la aparición de posturas.
Periodo de reingreso
4 horas posteriores a la aplicación.
Compatibilidad
DIPEL 2X se puede mezclar con uno o mas plaguicidas reguladores de crecimiento, surfactantes, no se debe mezclar con productos fuertemente alcalinos tales como caldo bordales, cal y polisulfuro de calcio
Fitotoxicidad
No se ha reportado fitotoxicidad de acuerdo al patrón de ese recomendado.

Responsabilidad civil:
"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

PRECAUCIÓN