

160000000



REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRICOLA

Concentrado Soluble (SL)

Composición:

Acido giberélico, 4% p/p *

Aditivos, 96% p/p

* Equivalente a 32 g de i.a por litro de producto comercial

Reg.PBUA N° 016-SENASA

Contenido
Neto: 5 Litros

Lote N°:

Fecha de
Formulación:

Fecha de
Vencimiento:

Distribuido por:
Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
San Isidro, Lima - Perú
Telf. 2113800

Formulado por:
Valent Biosciences Corp.
870 Technology Way
Libertyville, IL 60048
USA

Titular del Registro:
SMTM Perú SAC
Av. República de Panama 3531
Ol. 1203 - Lima 27
T: 511-421-4811

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO



INFLAMABLE



® = Marca Registrada de Valent
BioSciences Corporation, U.S.A.

PRECAUCIÓN

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

-Ryz Up es un regulador de crecimiento, su ingrediente activo es el ácido giberélico o GA3 sustancia que se encuentra de manera natural en las plantas e influye en su crecimiento y desarrollo.
 -Ryz Up aumenta la producción, promueve un mejor cuajado de frutos, uniformiza cosechas, retarda la maduración, interrumpe la latencia de tubérculos, semillas y bulbos, induce a la floración.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar de acuerdo a las indicaciones dadas para cada cultivo.

PERIODO DE REINGRESO: El ingreso al área tratada puede hacerse 4 horas posteriores a la aplicación.

COMPATIBILIDAD: No aplicar con productos fuertemente alcalinos.

FITOTOXICIDAD: Tiene buena fitocompatibilidad con los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

-Durante la preparación de la mezcla y la aplicación usar máscara, guantes protectores y ropa adecuada; no correr, jugar ni beber; mantener a los niños y animales lejos del lugar de la aplicación. Terminada la labor lavarse con agua y jabón y cambiarse de ropa.
 -No desatolar las boquillas de las pulverizadoras soplando con la boca. Usar los envases originales y cerrarlos herméticamente. Almacenarlos en lugares frescos y ventilados lejos del alcance de los niños y animales domésticos y bajo llave.
 -Evitar la contaminación de cultivos alimenticios, forrajes y fuentes de agua. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

PRIMEROS AUXILIOS:

-Ryz Up es ligeramente tóxico para el hombre y no se han detectado síntomas específicos; en caso de sufrir síntomas de intoxicación tales como mareo, vómitos, etc, llamar de inmediato al médico más cercano.
 -En caso de ingestión: elevar un lavado gástrico. Después de la aplicación lavarse las manos y el resto del cuerpo con abundante agua y jabón.
 -En caso que salpique la solución concentrada en los ojos, enjuáguelos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos. Lávese la piel con abundante agua y jabón. Quítase la ropa contaminada antes de volver a usarla. Provoque el vómito en caso de ingestión y consiga ayuda médica.

-Indicaciones para el médico: Trátese sintomáticamente.

-Antídoto: No se ha determinado un antídoto específico.

DL50 Oral aguda > 5 000 mg/kg

DL50 Dermal aguda > 2 000 mg/kg

TELÉFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN:

CICOTOX: 0800-1-3040

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

-Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilízalo triturándolo o perforándolo y deposítelo en un lugar designado por las autoridades locales para este fin.
 -Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
 -Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

-No vierta el sobrante del caldo de aspersión sobre vegetación no objeto de control ni en fuentes de agua.
 -No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, arroyos o estanques.
 -En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades locales para este fin.

Cultivos	Dosis ml/cil	Dosis (%)	Objetivos y momento de aplicación	PC* (días)	LMR** (ppm)
Alfalfa	50-100	--	Mayor crecimiento y producción. Aplicar 2 a 3 veces durante el período vegetativo.		
Café	50-100	--	Uniformizar floración. Aplicar cuando los brotes están hinchando o a la apertura de las primeras flores.		
Naranja	50-100	--	Uniformizar cosechas y retardar maduración. Aplicar antes del cambio de color de los frutos. No usar en naranja Valencia.		
Limón	5-25	--	Intermite latencia de tubérculos y estimula brotamiento uniforme. Sumergir los tubérculos durante 5 minutos.		
Papa	50-100	--	Logrará un mejor cuajado de frutos.	14	0.15
Tomate	125-200	--	Mayor crecimiento de granos. Las aplicaciones se realizarán según las variedades. Recomendaciones técnicas (ver folio).		
Vid	50-100	--	Aumentar la producción. Aplicar al inicio de la floración y 21 días antes de la cosecha.		
Papino, Melón, Zapallo	50-100	--	Aumentar la producción de hojas. Aplicar 2 a 3 veces durante el período vegetativo.		
Té	--	4.63	Para prolongar en post cosecha la vida verde del banano, aplicar con una aspersora manual a la corona y las manos o tallos.		

PC = Período de Carenia (días) LMR = Límite Máximo de Residuos (ppm)

