

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO".

"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Precauciones y Advertencias de Uso y Aplicación:

- Durante la preparación de la mezcla y la aplicación usar máscara, guantes protectores y ropa adecuada; no comer, no fumar ni beber; mantener a los niños y animales lejos del lugar de la aplicación.
- Terminada la labor lavarse con agua y jabón y cambiarse de ropa.
- No desatorar las boquillas de las pulverizadoras soplando con la boca. Usar los envases originales y cerrarlos herméticamente.
- Almacenarlos en lugares frescos y ventilados lejos del alcance de los niños y animales domésticos y bajo llave.
- Evitar la contaminación de cultivos alimenticios, lorrajeros y fuentes de agua.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni lorrajes.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Si ocurre contacto con los ojos o la piel, lave con abundante cantidad de agua. Si la irritación persiste u ocurren signos de toxicidad, busque atención médica.

-Tratase sintomáticamente

-No se ha determinado un antídoto específico.

TELEFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACION:

CICOTOX-0800-1-3040

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES

VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice triturándolo o perforándolo y deposítelo en un lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase a su punto de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, arroyos o estanques.
- Aplique el producto como se indica en la etiqueta, no reutilice los envases destruyalos.

Promalina®

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRICOLA

Concentrado Soluble (SL)

Composición:

Citoquinina, 18,9 g/l
Giberelina, 18,9 g/l
Aditivos, csp 1 litro

Reg. PDUJ N° 048- SENASA

Titular del Registro:

SAITM Peru SAC
Av República de Panamá 3531
D.L. 1203 - Lima 27
T: 511-421-4811

Formulado por:
VALENT BIOSCIENCES

Distribuido por:

Bayer S.A.
Pasaje de la República 3074
San Isidro, Lima - Perú
Tel: 2113800



Contenido Neto:

Lote N°

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

® - Marca Registrada de Valent Biosciences

PRECAUCIÓN



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

- Promalina es un regulador de crecimiento vegetal cuyos ingredientes activos son el ácido giberico y la citoquinina las cuales influyen en el crecimiento y desarrollo de las plantas.
- Mejora la calidad del producto e incrementa significativamente las cosechas de los cultivos.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivos	Momento de aplicación	DOSIS		UAF	
		%	l/ha	l/ha	l/ha
Algodón	Al inicio de floración y/o fructificación				
	Aplicación fraccionada (65-125 ml) en ambos momentos de aplicación.			0.125	Per
	Aplicación total (125-250 ml) en cualquiera de los momentos indicados.			0.25	Per
Pimiento	1 aplc. al inicio de la primera floración	0.03	60	0.125	Per
	2 aplc. al cuajado de la primera floración				
	3 aplc. en la maduración de la primera floración.				
Fresa	Inicio de floración:	0.0	60	0.125	Per
	1 aplc. a los 20 días del trasplante				
	2 aplc. 30 días después de la 1ra.				
Papaya	1 aplc. inicio de floración.	0.0	60	0.125	Per
	2 aplc. 15 días después de la primera aplicación.				
	3 aplc. Después de la primera cosecha				
Papa	Variedad precoz: Inicio de tuberización.			0.125	Per
	Variedad tardía: Fraccionada				
	1 aplc. inicio de tuberización	0.03	60	0.125	Per
Tomate	2 aplc. 15 días después de la primera				
	1 aplc. inicio de floración	0.03	60-90	0.125	Per
	2 aplc. 15 a 20 días después de la primera.	0.045	60-90	0.180	Per
Ajo	Inicio de macollamiento.	0.01	30	0.06	Per
	1 aplc. al inicio de la primera floración				
	2 aplc. al cuajado de la primera floración	0.03	60	0.125	Per
Maíz	3 aplc. en la maduración de la primera				
	Inicio de botoneo	0.06	120	0.25	Per
	Desde el momento de plena floración hasta comienzo de caída de pétalos.	0.12	250		

N/A=No aplicable **PC=Período de carencia (en días) ***LMA=Límite Máximo de Residuo (en ppm)
FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar durante las primeras horas de la mañana cuando las condiciones climáticas aseguren buena absorción del producto: humedad relativa elevada y tiempo fresco.

PERÍODO DE REINGRESO: El ingreso al área tratada puede hacerse 4 horas posteriores a la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de plaguicidas y abonos foliares de uso común sin embargo se recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes de las aplicaciones.

FITOTOXICIDAD:

Tiene buena fitocompatibilidad con los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.