

Sumisclex

50% PM

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Polvo Mojable (WP)

Composición:
Procymidone, 500 g/kg
Aditivos csp, 1 kilo

Reg. N° PQUA 85-SENASA

TITULAR DE REGISTRO:
SMTM PERU S.A.C

Av. Circunvalación Del Club Golf Los Incas N° 208, Interior 705-B, TORRE III.
Urbanización Club Golf Los Incas
Santiago de Surco. Lima, Perú

FORMULADO POR:

Sumitomo Chemical Co. Ltda
27-1, Shinkawa 2-cho, Chou-Ku
Tokyo 104-8260, Japón

DISTRIBUIDO POR:



Bayer S.A.

Calle Amador Merino Reyna 223,
Interior 802. Urb. Jardín. San isidro.
Telf: (01) 211 3800

CONTENIDO NETO: 50 Kg

Lote N°:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO EXPLOSIVO NO INFLAMABLE

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Almacenar el producto herméticamente cerrado en lugares frescos y ventilados lejos del alcance de los niños.
- Causa irritación moderada en los ojos.
- Durante la preparación y la aplicación usar ropa, máscara y guantes protectores.
- Evitar el contacto con la piel e inhalar al momento de la aplicación.
- Mantener alejados a los niños y animales del lugar de la aplicación.
- No comer ni fumar durante la aplicación.
- Lavarse con agua y jabón y cambiarse de ropa después de la aplicación.
- No verter el resto del caldo de aspersión sobre fuentes de agua (lagos, ríos, estanques, acequias).
- No se debe almacenar ni transportar conjuntamente con productos alimenticios, forrajeros y medicinas.
- Los sobrantes del producto deben guardarse en el envase original bien tapados.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Dicarboximidas

- Si se ha contaminado la piel, acudir de inmediato al médico, entretanto cambiar de ropa contaminada al paciente y lavar con abundante agua y jabón.
 - En caso de intoxicación por ingestión dar de beber 1-2 vasos de agua e inducir el vómito mecánicamente introduciendo un dedo en la garganta.
 - En caso de contacto con los ojos lavarse con agua durante por lo menos 15 minutos y solicitar atención médica inmediata.
- No se ha determinado un antídoto específico. El tratamiento es básicamente sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN

SAMU: 106 CISPROQUIM 080-050-847 SMTM PERU S.A.C: 01 421 4811

MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No mezclar con residuos municipales.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, no contaminar lagos, ríos, estanques ni fuentes de agua con desechos y envases vacíos ni con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, arroyos o estanques.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permita animales en el área tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- No usar el producto en suelos con napa freática superficial.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	ENFERMEDAD	AGENTE CAUSAL	DOSIS (ml)	OBSERVACIONES	LMR** (ppm)	PC* (Días)
Vid	Podredumbre o moho gris	Botrytis cinerea	0.05 - 0.1% 100 - 200 g/cil	Aplicar de preferencia en forma preventiva protegiendo principalmente el período de floración 1ra aplic.:Caída de capucha floral 2da aplic.:Antes del cierre del racimo 3ra.aplic.:Al inicio de la maduración o envere	28	5
Fresa	Podredumbre o moho gris	Botrytis cinerea	0.05 - 0.1% 100 - 200 g/cil	1ra aplic.:50% de floración 2da aplic.:Fin de floración 3ra.aplic.:Frutos verdes	21	2
Naranja	Podredumbre o moho gris	Botrytis cinerea	0.05 - 0.1% 100 - 200 g/cil	1ra aplic.:50% de floración 2da aplic.:Al término de la floración	n/d	3
Ajo Cebolla	Podredumbre blanca Podredumbre o moho gris	Sclerotium cepivorum Botrytis cinerea	0.05 - 0.1% 100 - 200 g/cil 2.5 - 5 g/kg semilla (dientes) 0.05 - 0.1% 100 - 200 g/cil	Aplicar dirigiendo la aspersión al cuello de la planta. Impregnando en seco mediante cilindro rotatorio. Mojar bien las plantas dirigiendo la aspersión al cuello de la planta. Mezclar con Agridex 0.05% ó 100 ml/cil.	1	2
Tomate Frejol Habas Apio Pepino Zapallo Sandía	Podredumbre o moho gris Mancha de la hoja	Botrytis cinerea Alternariasp.	0.05 - 0.1% 100 - 200 g/cil	Proteger la flora y frutos pequeños 1ra aplic.:50% floración 2da aplic.:Término de floración 3ra aplic. y otras: Repetir cada 7 ó 14 días según necesidad.	21	3
Cacao Melocotonero	Monilia o podredumbre morena	Monilia sp	0.05 - 0.1% 100 - 200 g/cil	Aplicar al inicio del ataque	n/d	n/d
Flores y ornamentales	Podredumbre o moho gris Podredumbre blanca Mancha de la hoja	Botrytis cinerea Sclerotinia sp. Alternaria sp	0.05 - 0.1% 100 - 200 g/cil	Aplicación: Cuando se encuentre en estado de botón floral	n/d	n/d
Lechuga	Podredumbre o moho gris Podredumbre blanca	Botrytis cinerea Sclerotinia sp	0.05 - 0.1% 100 - 200 g/cil	Pulverizar en los siguientes estados de planta: 1 - 3 hojas 2 - 8 hojas 3 - 12 hojas	7	2

* PC = Período de carencia (días)

** LMR = Límite Máximo de Residuos (ppm)

n/d= No determinado

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Sumislex 50% PM es un fungicida preventivo del grupo dicarboximide, de amplio espectro de acción, para el control de Botrytis, Alternaria, Monilia, etc.

- Se aplica en pulverizaciones previa mezcla en agua, es recomendable preparar previamente una mezcla en un volumen reducido de agua agitando continuamente y luego agregar el resto del agua al tanque de aspersión,

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Seguir las indicaciones para cada cultivo según el cuadro de uso

PERIODO DE REINGRESO

24 horas

COMPATIBILIDAD

Se puede aplicar en mezcla con los principales fungicidas, insecticidas y abonos foliares sin embargo se recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes de las aplicaciones.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico con los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados,si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

