

15 cm

28 cm

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino por ingestión y por contacto con la piel. No ingerir y evite el contacto con la piel y la ropa.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar en un lugar fresco, seco, con buena ventilación, lejos de la casa o habitación.
- Realizar la aplicación siguiendo al dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Ácido Fosfórico
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muéstrelle la etiqueta: No deje solo al intoxicado.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. Si el paciente está inconsciente no dar nada por vía oral.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- ANTIDOTO: No existe antídoto específico. Administrar tratamiento sintomático y de soporte.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106  
SHARDA PERU: 222-2695

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi - acuáticas.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INZENDO

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición:

Glufosinate ammonium.....200 g/L  
Aditivos csp.....1 L

Reg. PQUA N° 1713 - SENASA

Titular del Registro:  
**SHARDA PERU S.A.C**  
Calle Las Castañitas 138  
Urb. El Palomar, San Isidro  
Teléfono: 222-2695

Importado y distribuido por:



**SILVESTRE PERÚ S.A.C.**  
Calle Arica 242 Miraflores, Lima 18 - Perú  
Teléfono: (01) 617 - 3300

Formulado por:  
**LIER CHEMICAL CO. LTD**  
Economical and Technical  
Development Zone, Mianyang,  
Sichuan, 621000, PR. CHINA.  
Teléfono: +86-816-2845441

Contenido Neto: 4 L

Lote N°:  
Fecha de Form.:  
Fecha de Venc.:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**INZENDO** es un herbicida de acción por contacto y no selectivo. Tiene como ingrediente activo al Glufosinate ammonium, el cual es absorbido por las hojas de las plantas pero su translocación es limitada dentro de la planta.

PREPARACIÓN:

Aplicar con equipos convencionales con boquillas de abanico.

**INZENDO** se aplica en solución con agua, realizar una pre-mezcla y seguidamente vaciarla en el tanque de preparación previamente llenado hasta la mitad con agua, luego completar el agua y mover hasta obtener una mezcla homogénea.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

| CULTIVO   | PLAGA           |                                         | DOSIS   |         | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|-----------|-----------------|-----------------------------------------|---------|---------|----------------|-----------------|
|           | Nombre común    | Nombre científico                       | L/200L  | L/ha    |                |                 |
| Vid       | Verdolaga       | Portulaca oleraceae                     | 1 - 1.5 | 2 - 3   | 15             | 0.05            |
|           | Yuyo Coquito    | Amaranthus spinosus<br>Cyperus rotundus |         |         |                |                 |
| Palto     | Amor seco       | Bidens pilosa                           | -       | 1.5 - 2 | 1              | 0.1             |
|           | Gramma china    | Sorghum halepense                       |         |         |                |                 |
| Mango     | Yuyo            | Amaranthus dubius                       | 1 - 1.5 | -       | 1              | 0.1             |
|           | Amor seco       | Bidens pilosa                           |         |         |                |                 |
| Mandarina | Yuyo            | Amaranthus dubius                       | 1 - 1.5 | -       | 15             | 0.05            |
|           | Verdolaga       | Portulaca oleracea                      |         |         |                |                 |
| Espárrago | Gramma dulce    | Cynodon dactylon                        | -       | 3       | 1              | 0.4             |
|           | Higuerilla      | Ricinus communis                        |         |         |                |                 |
| Arándano  | Amor seco       | Bidens pilosa                           | 1       | -       | 13             | 0.15            |
|           | Verdolaga       | Portulaca oleracea                      |         |         |                |                 |
|           | Pata de gallina | Eleusine indica                         | 1.5     | -       |                |                 |

L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón)

P.C.: Período de carencia (días)

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Para el cultivo de vid, mango, mandarina y espárrago, aplicar una vez por campaña por año. Para el cultivo de palto aplicar 2 veces por campaña con un intervalo de 20 días. Para el cultivo de arándano, aplicar como máximo 2 veces por campaña, con un intervalo de 30 días, considerando 1 campaña al año. Dosis máxima de aplicación: 1.5L/ha. Se recomienda aplicar en post-emergencia cuando las malezas estén pequeñas (2 a 5 hojas).

PERIODO DE REINGRESO:

No reingresar al campo tratado hasta después de 24 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este periodo. Deberá utilizar equipo de protección.

COMPATIBILIDAD:

**INZENDO** es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común excepto con los carbonatados. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

