

CAMPO-CYMOZEB

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
FUNGICIDA AGRICOLA
Polvo Mojable (WP)

COMPOSICIÓN:
Cymoxanil 80 g/kg
Mancozeb 640 g/kg
Aditivos c.s.p.1kg

Reg. PQUA Nº 1630 - SENASA

Titular de Registro:
PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.
Av. Los Mirtos 239. Lince, Lima 14. Perú.
Teléfono: +51-1-222-2795

Formulado por:
NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.
Room 512, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.
Teléfono: +86-574-87301088

GENERIC
your exclusive agrochemical partner

Importado y Distribuido por:
AGROINDUSTRIAS LA CAMPIÑA S.A.C
Av. Hipolito Unanue Nro.317-Urb.La Colonial
-Prov. Const. Del Callao-Peru
Teléfono: +51-1-408-2006 / 962692366 / 977191952

AGROINCA
AGROINDUSTRIAS LA CAMPIÑA S.A.C.
R.O.U. REGISTRADO
PERU

Contenido Neto: 1 Kg
Nº Lote:
F. de Form.:
F. de Venc.:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”


PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Evite el contacto con la piel y la ropa.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Acetamidas + Dithiocarbamate
- En caso de intoxicación, llame al medico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito ni administrar nada por via oral si la persona está inconsciente o padece de convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, levantar los parpados y lavar los ojos con abundante agua limpia por lo menos 15 minutos. Retirar lentes de contacto si los hubiera y continuar enjuagandolos.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar inmediatamente con abundante agua y jabón.
- Nota al médico:**
 - Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
ESSALUD: 411-8000 Anexo 4, Infosalud: 0800-10-828
CICOTOX: 0800-1-3040, 328-77-00



CAMPO - CYMOZEB
PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
FUNGICIDA AGRICOLA
Polvo Mojable (WP)

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

CAMPO - CYMOZEB 720 WP es un fungicida compuesto por dos ingredientes activos mancozeb (fungicida de contacto) y cymoxanil (fungicida preventivo), que le brindan un efecto protectorio y curativo a la planta. Se recomienda usar CAMPO - CYMOZEB 720 WP para el control de enfermedades producidas por hongos oomycetos.

Preparación:
Hacer una pre mezcla en una reducida cantidad de agua, agitar bien y luego agregar al resto de agua en el tanque de aplicación. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Ca 200 l (Kg)	Ha (Kg)		
CEBOLLA	MILDIU	Peronospora destructor	0.5	1.0	7	0.05* 1.0**

PC: Periodo de Carenzia. LMR: Límite Máximo de Residuos (partes por millón - ppm).
*Cymoxanil ** Mancozeb

COMPATIBILIDAD
CAMPO - CYMOZEB 720 WP es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando los de marcada reacción alcalina, hacer una pequeña prueba en una reducida cantidad de agua antes de hacer la mezcla completa.

FITOTOXICIDAD
CAMPO - CYMOZEB 720 WP no es fitotoxico usado a las dosis y usos recomendados en la presente etiqueta.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN
Iniciar las aplicaciones al observar el primer sintoma de enfermedad del cultivo. Realizar hasta 2 aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO
No ingresar a las áreas tratadas antes de las 24 horas después de la aplicación.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aqui recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Después de usar el contenido, inutilícelo, triturándolo o perforándolo y depositelo en los sitios destinados por las autoridades para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarla en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

