

ESPEJOS GRAF
GRÁFICA INTERNA

CAJA: PLEDGE 51 WG x 1 Kg
Fecha: 22-11-2022

Producto Cian
Producto Amarillo
Producto Magenta
Producto Negro
Pant. 293 C

Medida : 8.5 x 15.5 x 19.0 cm
Material: Cartón Duplex Maule de 330 grs.

Serfi

15.5 cm

8.5 cm

15.5 cm

8.5 cm

PLEDGE[®] 51 WG

PLEDGE[®] 51 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

Composición:

Flumioxazin.....510 g/kg
Aditivos.....c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 1730-SENASA

Titular de registro:

SMTM PERU S.A.C
Av. Circunvalación Del Club Golf Los Incas N° 208,
Interior 705-B, TORRE III,
Urbanización Club Golf Los Incas
Santiago de Surco, Lima, Perú

Formulado por:

VALENT
VALENT U.S.A LLC
4600 Norris Canyon Road P.O Box 5075
San Ramon, CA 94583. Estados Unidos

Importado y distribuido por:

Serfi

SERFI S.A.
Av. República de Panamá 2577,
La Victoria, Lima-Perú
Tel.: (011)710-4068

Contenido neto: 1 Kg

Lote N°:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Este producto es de cuidado. No ingerir. Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión. Evite contacto con la piel y la ropa.

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado. Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado. No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.

Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: n-fenilimidas.

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta.

En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral, si la persona esta inconsciente o convulsione.

En caso de contacto con la piel retirar la ropa y calzado contaminado. Báñese con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén cerrados. En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

Antídoto: No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIAS:
CISPROQUIM: 080-050-847
SAMU: 106

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PLEDGE 51 WG es un nuevo herbicida que actúa por contacto, eficaz para el control de malezas de hoja ancha en pre emergencia y post emergencia temprana. **PLEDGE 51 WG** utiliza la energía del sol inhibiendo la actividad de protoporfirinógeno oxidasa (PPO), responsable de la acumulación de porfirinas. Las porfirinas acumuladas provocan en presencia de luz y oxígeno la peroxidación de las membranas lipídicas, conduce a daños irreversibles de la estructura y de la función de las membranas celulares, siendo una solución para el control de malezas resistentes o tolerantes a otros grupos químicos.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

ADVERTENCIA: USO PERMITIDO SOLO EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AUTORIZADAS

CUADRO DE USO

Cultivo	Malezas		Dosis Kg/Ha	P.C (días)	L.M.R (ppm)
	Nombre científico	Nombre común			
Caña de azúcar	<i>Isomoeis quinquefolia</i>	Camotillo, bejuco	0.20-0.25	90	0.02
	<i>Cucumis dipsacifolius</i>	jaboncillo de monte			
	<i>Euphorbia heterophylla</i>	Leche-leche			
	<i>Borhavia caribaea</i>	Paga - Paga			
	<i>Ricinus communis</i>	Higuera			
	<i>Bidens pilosa</i>	Amor seco			
Vid	<i>Sidaea verticillata</i>	Rabo de zorro	0.30	60	0.05
	<i>Cyperus rotundus</i>	Coquillo			
	<i>Elysiene indica</i>	Paña de gallina			
	<i>Euphorbia serpens</i>	Leche-leche			
	<i>Bidens pilosa</i>	Amor seco			
	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdórgaga			
	<i>Traxacum officinalis</i>	Diente de león			
	<i>Amaranthus hybridus</i>	Yuyo hembra			

PC= Período de carencia.

LMR= Límite Máximo de Residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda aplicar **PLEDGE 51 WG** (1.0 flumioxazin) una aplicación por campaña como máximo para los cultivos de caña de azúcar y vid, considerando una campaña al año para ambos cultivos.

En pre-emergencia puede aplicarse desde el momento de la siembra, antes de que aparezcan las malezas y cuando haya suficiente humedad en el suelo.

En post-emergencia temprana los mejores resultados se obtienen cuando la maleza está en crecimiento activo (menor a 5 cm. de altura).

PERÍODO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

Ingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

Por su especificidad sobre el control de malezas se recomienda aplicarlo solo.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico a los cultivos recomendados, al ser aplicado de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta y a las Buenas Prácticas Agrícolas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

* Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la caja o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

Tóxico para organismos acuáticos y semiacuáticos. No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos. No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación de sobranes del producto. Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros. Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables. En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

19.00 cm