

Suitor®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Gránulos dispersables (WG)

COMPOSICIÓN

Fludioxonil 250 g/Kg
Cyprodinil 375 g/Kg
Aditivos csp 1Kg

Registro PQUA N° 1728 - SENASA

Titular de Registro, Importador y Distribuidor:

AGREVO ANDINA S.A.C.

Jr. San Sebastián 298,
Urb. El Sol de la Molina II Etapa,
La Molina, Lima - Perú
Teléfono: (01) 6328482



Fabricante, Formulador:

FLAGCHEM INTERNATIONAL CO., LTD

29 F, Soho Mansion, No 8 South Zhongshan Road, Nanjing
CHINA

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido Neto: **500g**

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar, vapor o aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Fenilpirrol (fludioxonil) + Anilino y pirimidina (cyprodinil)
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y hoja informativa.
- En caso de ingestión: No induzca al vómito, no dar ninguna cosa a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por aproximadamente 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel: Quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación: Colocar a la persona en un sitio con aire fresco y monitorear que no exista dificultad respiratoria, si existe, practicar respiración artificial.

Nota al médico:

- Antídoto: No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA TOXICOLÓGICA: ESSALUD: 411 8000 anexo 4, INFOSALUD: 0800-10-828.
CICOTOX: 0800-1-3040, 328-7700

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido del envase inutilícelo triturándolo o perforándola y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para éste fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos acuáticos, plantas acuática y semi-acuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeable.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.
- Incorporar materia orgánica a los suelos para mejorar la retención del SUITOR, reducir su movilidad y minimizar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

SUITOR es un fungicida combinado a base de fludioxonil y cyprodinil que se usa para prevenir y controlar la enfermedad fungosa del Moho gris en el cultivo de vid.

Fludioxonil es un fungicida no sistémico que actúa por contacto con larga actividad residual y con acción translaminar. Mientras que el Cyprodinil es un fungicida sistémico absorbido por los tejidos de la planta y transportado vía xilema, inhibiendo la penetración y el crecimiento del micelio del hongo.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	ENFERMEDAD		Dosis Kg/ha	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Vid	Moho gris o Podedumbre gris	Botrytis cinerea	0.8-1.0	7	2* 3**

PC:Período de carencia

LMR: Límite máximo de residuos

*Fludioxonil

** Cyprodinil

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña. Aplicar cada 10 a 12 días cuando se observa los primeros síntomas de la enfermedad.

PERÍODO DE REINGRESO: 12 horas o cuando las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad.

COMPATIBILIDAD:

SUITOR es compatible con plaguicidas de uso común, excepto ácidos fuertes, álcalis fuertes y materiales oxidantes fuertes

FITOTOXICIDAD:

SUITOR no presenta efectos fitotóxicos en los cultivos y en las dosis aquí señalados.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en éste envase corresponden a las anotadas en la etiqueta que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.