

SUITOR

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Gránulos dispersables (WG)

COMPOSICIÓN

Fludioxonil 250 g/Kg
Cyprodinil 375 g/Kg
Aditivos csp 1Kg

Registro PQUA N° 1728 -SENASA

Titular de Registro,Importado y Distribuido por:
AGREVO ANDINA S.A.C.

Los Fresnos 440-California-Víctor Larco Herrera
Trujillo, PERÚ
Teléfono: 044-610509

Fabricante, Formulator:
FLAGCHEM INTERNATIONAL CO., LTD
29 F, Soho Mansion, No 8 South Zhongshan Road, Nanjing
CHINA

Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Contenido Neto:
Fecha de Vencimiento:

“LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar, vapor o aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- PRIMEROS AUXILIOS:**
 - Grupo químico: Fenilpirrol + Anilino pirimidine
 - En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y Hoja informativa.
 - En caso de ingestión: No induzca al vómito, no dar ninguna cosa a una persona inconsciente.
 - En caso de contacto de los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por aproximadamente 15 minutos.
 - En caso de contacto con la piel: Quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.
 - En caso de inhalación: Colocar a la persona en un sitio con aire fresco y monitorear que no exista dificultad respiratoria, si existe, practicar respiración artificial.
- Nota al médico:**
 - Antídoto: No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
 - Teléfonos de Emergencia: **CICOTOX:** 0800-13040 ó 328-7398 (gratuito) ,**ESSALUD:** 0801-10200 (gratuito)
- MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**
 - Después de usar el contenido del envase inutilícelo triturándolo o perforándola y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para éste fin.
- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**
 - Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi-acuáticas.
 - No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
 - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
 - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
 - Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
 - El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
 - En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.
 - Incorporar materia orgánica a los suelos para mejorar la retención del FLUDIOXONIL + CYPRODINIL, reducir su movilidad y minimizar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

SUITOR es un fungicida combinado a base de fludioxonil y cyprodinil que se usa para prevenir y controlar la enfermedad fungosa del Moho gris en el cultivo de vid. Fludioxonil es un fungicida no sistémico que actúa por contacto con larga actividad residual y con acción translaminar. Mientras que el Cyprodinil es un fungicida sistémico absorbido por los tejidos de la planta y transportado vía xilema, inhibiendo la penetración y el crecimiento del micelio del hongo.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña. Aplicar cada 10 a 12 días cuando se observa los primeros síntomas de la enfermedad.

PERÍODO DE REINGRESO A: 12 horas o cuando las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad.

COMPATIBILIDAD: SUITOR es compatible con plaguicidas de uso común, excepto ácidos fuertes, acális fuertes y materiales oxidantes fuertes

FITOTOXICIDAD: SUITOR no presenta efectos fitotóxicos en los cultivos y en las dosis aquí señaladas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en éste envase corresponden a las anotadas en la etiqueta que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	ENFERMEDAD		Dosis Kg/ha	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Vid	Moho gris o Podedumbre gris	Botrytis cinerea	0.80-1.00	7	2* 3**

PC:Período de carencia

LMR: Límite máximo de residuos

*Fludioxonil

** Cyprodinil

® Marca registrada de FARMAGRO S.A.



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

