

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Peligroso a las vías respiratorias, evite respirar la aspersión. Utilice equipo de protección respiratoria.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese la ropa y bañese con abundante agua y jabón .Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado y almacenélo en lugares frescos y ventilados.
- No utilizar los envases vacíos para almacenar bebidas, alimentos, medicinas, agua ni forraje.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Anilino pirimidine
- En caso de ingestión, llevar al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta. No provoque el vómito si la persona está inconsciente.
 - En caso de inhalación retirar al paciente a un lugar fresco y aplicar oxígeno o respiración artificial; llevar al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta.
 - En caso de contacto con los ojos o alguna parte del cuerpo, lávelos inmediatamente con agua y jabón durante 15 min.
 - En caso de contacto con la piel, remover la ropa contaminada y lavar con abundante agua y jabón la zona afectada.

Antídoto: No existe. Tratamiento sintomático.
Teléfonos de emergencia en caso de intoxicación:
CICOTOX 0800-1-3040 CIPROSQUIM: 0800-50847 FARMAGRO: 6141500 ESSALUD: 117

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Realizar obligatoriamente el triple lavado.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes, del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 5 metros.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales y/o subterráneas.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. *No permitir animales en el área tratada*.
- En caso de derrames, recoger el producto y depositarlo en lugares destinados por las autoridades locales para este fin.
- Aplicar temprano en la mañana o en la tarde, para evitar la deriva por el viento.



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:
Pyrimethanil..... 400 g/L
Aditivos..... c.s.p 1L

Reg. PQUA N° 707 - SENASA

Titular del registro, Importador y Distribuidor:
FARMAGRO S.A.
Av. Alfredo Mendiola 6068, Los Olivos - Lima, PERÚ
Teléfono: 6141500 Fax: 6141517



Formulador:
IPROCHEM COMPANY LIMITED
35F, Guomao Business Mansion, 3005 Nanhu Rd, Luohu District, Shenzhen
CHINA

Lote:
Contenido Neto: **10L**
F. Fabricación:
F. Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

© Marca registrada de FARMAGRO S.A.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

SCUADRA es un fungicida de contacto con acción traslaminar, que pertenece al grupo de los Anilino pirimidines y que actúa inhibiendo la producción de enzimas del hongo, y con ello interrumpe su desarrollo.
Se aplica en aspersión previa mezcla en agua. Se recomienda llenar el cilindro hasta la mitad y agregar la dosis recomendada de **SCUADRA**; agitar continuamente y completar el resto con agua. Aplicar en aspersión con un equipo en perfecto estado y debidamente calibrado.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”
USOS Y DOSIFICACIONES RECOMENDADAS:

CULTIVO	NOMBRE DE LA PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	ml/Cil	L/ha		
Fresa	Botrytis	Botrytis cinerea	200	-	7	2
Palto	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	-	3.0	N/d	0.05
Vid	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	200	-	21	5
Alcachofa	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	-	0.5	3	0.01
Pimiento	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	200	-	3	2
Mandarina	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	200	-	0	7

P.C.= Período de carencia en días; L.M.R.= Límite máximo de residuos en ppm N/d = No determinado

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

- Aplicar cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones favorezcan la aparición de la enfermedad.
- Se puede aplicar durante la etapa de floración y fructificación, respetando el período de carencia.
- Realizar como máximo 1 aplicación/campaña; considerando como máximo 2 campañas/año.
- Aplicar como máximo 0.4L/Ha
- Realizar rotaciones con fungicidas de diferente modo de acción.
- PERÍODO DE REINGRESO:** Después de 24 horas de realizada la aplicación.
- COMPATIBILIDAD:** Compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común a excepción de aquellos de reacción alcalina. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad previa.
- FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico a los cultivos recomendados, al ser aplicado de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta y a las Buenas Prácticas Agrícolas.
- RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

