

Etiqueta Clestar x 20L Pead 50 28.7 x 15 29.11.16

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Causa daño temporal a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos ó agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

*** PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo químico: Carbamatos.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. no administrar nada por la vía oral si la persona está inconsciente ó padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

ANTIDOTO: Sulfato de Atropina. Aplicar de 1.0 a 2.0 mg/kg de peso (adulto) y 0.02 - 0.05 mg/kg de peso (menores de 12 años)

TELEFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACION:
ESSALUD: 0801-1-0200/CICOTOX: 0800-1-3040

MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo y depositarlo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.
Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL AMBIENTE

Peligroso para las abejas y artrópodos benéficos. Peligroso para organismos acuáticos.
No contaminar ríos, estanques ó arroyos con los desechos ó envases vacíos.
No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación ó sobrantes del producto.
Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales ó en suelos altamente permeables.
En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

CLESTAR[®] 375 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada (SC)

COMPOSICIÓN:

Thiodicarb 375 g/l
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° XXX - SENASA

FARMAGRO S.A.
MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

Titular del Registro:

FARMAGRO S.A.

Av. Alfredo Mendiola 6068, Los Olivos - Lima, PERÚ

Teléfono: 6141500 Fax: 6141517

Formulador:

IPROCHEM COMPANY LIMITED

35F, Guomao Business Mansion, 3005 Nanhu Rd.,

Luohu District, Shenzhen

CHINA



Contenido Neto: **20L**

N° Lote:

Fecha de Formulaciòn:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: CLESTAR 375 SC un insecticida que actúa principalmente por vía estomacal con reducido efecto por contacto. Se emplea para el control específico de "Cogollero" Spodoptera frugiperda en maíz..

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Se puede preparar diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro ó mochila según sea el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido se agita y se procede a aplicar.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	NOMBRE DE LA PLAGA		L/ha.	DOSIS mL/200 L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Común	Técnico				
Maíz	Cogollero	Spodoptera frugiperda	0.8	400	14	2

P.C.= Periodo de carencia en días;

L.M.R.= Limite máximo de residuos en ppm.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar 1 aplicación por campaña. Previa evaluación cuando se observe los primeros estadios larvales.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

CLESTAR 375 SC es compatible con plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

CLESTAR 375 SC no presenta efectos fitotóxicos en los cultivos y en las dosis aquí señaladas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".