



ETIQUETA

Mostro 50 SG - CAISAC

Revisión: 001
Aprobado:
Fecha:
Página: 1 - 6

10 x 14 cm

MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

MOSTRO[®] 50 SG

INSECTICIDA

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS SOLUBLE - SG

COMPOSICIÓN

Eamectin benzoate 5%
Aditivos c.s.p. 100%

Registro: PQUA N°1761-SENASA

Titular de Registro, Importado y
Distribuido por:



Av. Benavides 1579, 7mo piso, Oficina 702, Edificio del Park II, Lima 18- Perú.
Telf.: (01) 253-6444 - atencionalciente@grupoandina.com.pe

Formulado por:
SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO, LTD
Oficina: piso 19th & 20th, Hanyu Financial Centre, Building
A3-4, No 7000 East Jingshi Road, Jinan, China 250101
Planta: Binhai Economic Development Area, Weifang
Shandong, China 262737.

Contenido Neto: 100g

Lote N°:
F. de Form:
F. de Venc:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES
DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Avermectina.
- Primeros auxilios: Acudir inmediatamente al centro hospitalario y mostrar la etiqueta.
- Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente los ojos con abundante agua por lo menos 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- Contacto con la piel: Quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón, incluyendo el cabello y debajo de las uñas.
- En caso de ingestión: No inducir el vómito, si el paciente está inconsciente no dar nada por vía oral.
- En caso de inhalación: retirar a la persona afectada del lugar de exposición. Controle la respiración, si fuera necesario dar respiración artificial.
- Antídoto: No existe antídoto específico, el tratamiento es netamente sintomático.

Teléfonos de Emergencia: SAMU: 116

CAISAC: (01) 253-6444

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o depositela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGAS		Dosis kg /ha	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Paprika	Gusano perforador	<i>Heliothis virescens</i>	0.175	7	0.02
Espárrago	Gusano perforador	<i>Heliothis virescens</i>	0.3	7	0.01
Maíz	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.175-0.2	7	0.01
Arroz	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.1 - 0.15	7	0.01
Palto	Gusano medidor	<i>Sabulodes aegrotata</i>	0.4-0.45	5	0.01

LMR: Límite Máximo de Residuos

PC: Periodo de carencia

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

